

臺北捷運公司 113 年 7 月 28 日新進技術專員(護理類)

甄試試題-護理學

請務必填寫姓名：_____。
應考編號：_____。

Ans. 選擇題：每題 2 分，共 50 題，計 100 分

1. [] 【3】 旅客確診為腸病毒，其接觸過的把手應用下列何項物質消毒？
(1)95%酒精 (2)75%酒精 (3)500ppm 濃度漂白水 (4)清水。
2. [] 【2】 引起登革熱病媒蚊下列何者正確？A. 埃及斑蚊 B. 三斑家蚊 C. 白頭家蚊 D. 白線斑蚊
(1)AB (2)AD (3)BC (4)ABCD。
3. [] 【3】 有關低血糖之臨床表徵，下列何者**錯誤**？
(1)心跳加快 (2)皮膚溼冷 (3)出現庫斯莫耳氏 (Kussmaul's) 呼吸 (4)全身無力。
4. [] 【3】 姚先生從月台跌入鐵軌造成 L1~L3 脊髓損傷，下列哪項**不是**脊髓休克的症狀？
(1)無法控制大小便 (2)腸道蠕動降低造成腹脹 (3)無法自行呼吸 (4)下半身麻痺。
5. [] 【4】 梁先生每週一、三、五下午 1 點至 5 點接受血液透析，因腎性貧血服用維生素 C 與葉酸，其服用時間下列何者正確？
(1)提前至中午 12 點與中餐一起服用 (2)依照時間下午 1 點服用
(3)下午 3 點透析中服用 (4)下午 5 點透析結束時服用。
6. [] 【1】 有關單純性疱疹之敘述，下列何者**錯誤**？
(1)是由水痘病毒感染所引起的 (2)第一型主要侵犯臉部和口腔，第二型多感染於會陰部 (3)單純疱疹是一種自限性疾病，一般 7~10 天就會自己好 (4)可透過接觸傳染。
7. [] 【4】 長期暴露於游離輻射環境的勞工易罹患下列何種疾病？
(1)白內障 (2)視網膜剝離 (3)聽力障礙 (4)白血病。
8. [] 【3】 王小姐化學治療後出現輕微的口腔炎時，下列護理措施何者最適宜？
(1)保持口腔乾燥，以避免刺激 (2)禁食，等口腔粘膜癒合後再進食 (3)鼓勵進食非刺激性食物，用餐後清潔口腔 (4)建議多攝取高纖維飲食，以促進口腔粘膜的癒合
9. [] 【2】 下列何種食品添加物會引起類交感神經興奮？
(1)漂白劑 (2)瘦肉精 (3)著色劑 (4)人工甘味劑。
10. [] 【3】 有關胃食道逆流的居家照護注意事項，下列何者正確？ A. 避免進行腹內壓升高的活動 B. 進食後需立即平躺 C. 需戒菸、酒及咖啡 D. 避免高油脂及高熱量食物
(1)ABC (2)ABD (3)ACD (4)ABCD。

臺北捷運公司 113 年 7 月 28 日新進技術專員(護理類)

甄試試題-護理學

11. [] 【2】 下列何者是較高罹患骨質疏鬆症風險的情況？ A. 67 歲女性，最後一次月經期為 15 年前 B. 45 歲女性，患紅斑性狼瘡一直服用腎上腺皮質醇治療劑 C. 30 歲男性，偶爾飲酒，身體質量指數 (BMI) 為 28 D. 35 歲男性，有癲癇病史，並定期服用 Dilantin
(1)ABC (2)ABD (3)ACD (4)ABCD。
12. [] 【4】 王先生患有糖尿病，有關糖尿病足之護理指導，下列何者正確？
(1)足部保持乾燥，勿擦拭任何乳液 (2)足部要使用熱水袋或電毯保暖 (3)出門要穿涼鞋，以避免香港腳 (4)穿鞋前要先檢視鞋內有否異物。
13. [] 【1】 續上題：王先生因糖尿病控制不佳出現酮酸中毒 (DKA)，下列何者不是酮酸中毒症狀？
(1)代謝性鹼中毒 (2)血糖升高 (3)呈現 Kussmaul breathing (4)血液及尿液酮體呈現陽性。
14. [] 【4】 有關糖化血色素 (HbA_{1c}) 檢查值之敘述，下列何者正確？
(1)可取代日常血糖及尿糖的監測 (2)用來評估缺鐵性貧血的控制成效 (3)HbA_{1c} 值在 13%以下表示糖尿病控制良好 (4)可作為糖尿病的診斷標準之一。
15. [] 【3】 紀同學，15 歲，早上捷運下車時不慎跌倒，導致右手多處傷口，護理師欲以繃帶包紮，有關繃帶包紮的原則和注意事項，下列何者錯誤？
(1)應先清洗傷口並覆蓋無菌敷料後，再包紮 (2)包紮部位若在骨突處，應先墊棉墊或合適之敷料 (3)包紮時，應抬高肢體，由近心端往遠心端包紮 (4)包紮的壓力應平均分布，第二圈應覆蓋前一圈範圍的 1/2 至 2/3
16. [] 【4】 王先生患有左心室衰竭，當突然出現急性呼吸困難、端坐呼吸、冒冷汗及咳出大量泡沫狀帶血痰，代表可能是出現下列何種併發症？
(1)支氣管擴張 (2)肺栓塞 (3)肺炎 (4)肺水腫。
17. [] 【3】 有關白內障摘除術後預防眼壓上升的護理指導，下列何者正確？
(1)可以彎腰撿起掉在地上的東西 (2)可採俯臥睡姿 (3)避免睡向手術側 (4)可以用力咳嗽或用力擤鼻涕。
18. [] 【3】 當出現下列哪些症狀代表有缺鐵性貧血情形？ A. 吞嚥困難 B. 舌炎 C. 運動協調能力變差 D. 湯匙狀指甲
(1)ABC (2)BCD (3)ABD (4)ABCD。
19. [] 【1】 有關梅尼爾氏症候群(Meniere's syndrome)之描述，下列何者錯誤？
(1)為中耳疾病 (2)發作時出現陣發性旋轉眩暈 (3)發作時出現耳鳴或耳悶塞感 (4)應避免增加壓力 (stress) 的活動減少發作機率。

甄試試題-護理學

20. [] 【2】 丁太太，64 歲曾因冠心症接受過冠狀動脈支架置放治療，為預防發作醫囑給予硝酸甘油錠(NTG)，教導病人舌下服用 NTG 注意事項，下列何者正確？
(1)心絞痛發作時，才需服藥，故 NTG 不需隨身攜帶 (2)藥物要存放在原有容器內，並且要避光及避熱 (3)在服用 NTG 一顆無效後，應立即至急診處就醫 (4)含服 NTG 時，如口腔有「麻痛」感，表示對藥物過敏就不要再含第二顆。
21. [] 【1】 續上題：有關預防丁太太心絞痛發作之護理指導，下列何者適當？
A. 勿暴露於冷空氣中並注意保暖 B. 多食用高纖維食物避免便秘
C. 若有吸菸習慣，需戒菸 D. 多執行等長心臟復健活動。
(1)ABC (2)BCD (3)ACD (4)ABCD。
22. [] 【4】 下列有關動脈及靜脈血管疾病的敘述，何者錯誤？
(1)靜脈血管疾病易有水腫，抬高後會改善 (2)動脈血管疾病有刺痛麻木感，靜脈血管疾病有搔癢感 (3)動脈血管疾病膚色蒼白，靜脈血管疾病膚色呈棕色 (4)動脈血管疾病走路時疼痛，抬高後疼痛會改善。
23. [] 【1】 有關類風溼性關節炎關節症狀之臨床表徵，下列何者錯誤？
(1)侵犯較小、末端的周邊關節，常為不對稱性、多發性發生
(2)晨間關節僵硬 (3)手指關節呈天鵝頸狀(swan-neck)
(4)近端指骨間關節發生畸形而形成鈕釦狀(button-locked)。
24. [] 【4】 下列何種貧血是與自體免疫有關，根本病因常是胃黏膜受損、萎縮，使胃腸分泌內在因子發生障礙所引起？
(1)葉酸缺乏性貧血 (2)缺鐵性貧血 (3)再生不良性貧血
(4)惡性貧血
25. [] 【1】 劉女士檢查的結果需要接受透析治療，他詢問你腹膜透析的優缺點，請問下列敘述何者不正確？
(1)腹膜透析較不會造成蛋白質的流失 (2)腹膜透析較不易造成不平衡症候群 (3)腹膜透析對於小分子的清除率較差 (4)腹膜透析對於常規生活限制較少
26. [] 【2】 續上題：劉女士診斷為末期腎臟疾病，接受左前臂動靜脈瘻管手術，術後之護理措施下列何者適當？ A. 為評估血液循環狀況應於執行動靜脈瘻管側手臂測量血壓 B. 術後握球運動可幫助瘻管塑成與增加血流量 C. 觸診動靜脈瘻管有震顫感，表示血流通暢 D. 不可在動靜脈瘻管處穿刺抽血 (1)ABC (2)BCD (3)ACD (4)ABCD
27. [] 【3】 續上題：劉女士在接受血液透析時測量血壓，當壓脈帶加壓手臂時，下列何種病患會出現遠端手掌手指屈曲痙攣？
(1)愛迪生氏症 (2)黏液水腫 (3)副甲狀腺功能低下症 (4)副甲狀腺功能亢進症。
28. [] 【2】 陳女士，主訴咳嗽或提重物的時候，會有漏尿的現象，請問關於陳女士之尿失禁下列敘述何者正確？ A. 因骨盆肌肉無力造成 B. 肥

甄試試題-護理學

胖、多產是導因 C. 屬於滿溢型尿失禁 D. 可教導凱格爾氏運動
(1)ABC (2)ABD (3)BCD (4)ABCD。

29. [] 【1】 王先生因天雨路滑不慎跌倒，導致小腿骨折上石膏固定，下列護理措施，何者**錯誤**？
(1)需測量石膏近心端的皮膚溫度 (2)需注意患肢遠端的拇指活動情形 (3)注意患肢的活動度 (4)評估石膏上的冷點、熱點及溼點。
30. [] 【4】 **續上題**：有關王先生小腿骨折使用石膏固定之衛教，下列何者**錯誤**？
(1)石膏邊緣常導致壓瘡，要適當的防護 (2)不可使用抓癢器伸入石膏肢體內抓癢 (3)肢體遠端呈現淡藍色表示靜脈循環受阻 (4)鼓勵多做等張運動，避免發生廢用症候群。
31. [] 【3】 **續上題**：教導王先生使用柺狀協助行走，教導的拐杖步態是「雙側拐杖和患肢同時前進，健肢再行至與其平行位置」請問此種步態是屬於下列何者？
(1)搖擺式 (2)二點式 (3)三點式 (4)四點式。
32. [] 【3】 江先生去年罹患痛風，多次發作，為降低發作機率對其飲食建議，下列何者**錯誤**？
(1)多進食柑橘類水果 (2)避免喝肉湯、濃湯 (3)多進食菇類及黃豆製品 (4)避免脫水。
33. [] 【2】 全髖關節置換病人之出院護理指導，下列何者**錯誤**？
(1)兩腿不可交叉，雙膝保持分開 (2)屈曲患部髖關節不可小於 90 度 (3)避免坐軟而深的沙發椅或低矮椅子 (4)避免提重物、跑、跳及患部過度用力。
34. [] 【3】 李先生因消化性潰瘍穿孔接受次全胃切除術(Billroth-II)，對於術後進食出現腹脹、噁心嘔吐、心悸、頭暈等症狀之護理措施，下列何者最適當？
(1)多攝取碳水化合物 (2)用餐時多喝湯 (3)採取少量多餐 (4)進餐後多散步走動。
35. [] 【3】 有關胰臟癌之敘述，下列何者正確？
(1)好發於女性，癒後佳 (2)胰體及胰尾癌最常見 (3)病患之血清胰澱粉酶(Amylase)會上升 (4)上腹部及右側肋緣鈍痛為最常見之症狀。
36. [] 【4】 下列何者是丁先生罹患消化性潰瘍(Peptic Ulcer)的促發因素？A. A 型人格特質 B. 進餐不定時，暴飲暴食 C. 長期服用類固醇 steroid D. 胃幽門桿菌感染
(1) ABC (2)BCD (3)ACD (4)ABCD。
37. [] 【3】 有關罹患膽結石的高風險族群，下列何者**錯誤**？
(1)使用口服避孕藥者 (2)服用動情素治療的停經婦女 (3)喜歡吃蔬菜水果者 (4)肥胖女性。

臺北捷運公司 113 年 7 月 28 日新進技術專員(護理類)

甄試試題-護理學

38. [] 【1】 有關會出現腹瀉合併大量血和膿樣黏液臨床表徵之腸胃道疾病，下列何者正確？
(1)潰瘍性結腸炎 (2)腸激躁症候群 (3)腸胃炎 (4)結腸癌。
39. [] 【2】 當結腸造瘻處經常有排氣聲及臭味出現時，應教導如何減輕症狀？
(1)鼓勵多喝碳水化合物飲料 (2)鼓勵細嚼慢嚥，吃飯時勿說話
(3)鼓勵多咀嚼口香糖 (4)鼓勵多吃硬堅果、豆類食物。
40. [] 【1】 頭部受傷後會先出現清明期，再突然發生意識障礙的為下列何種情形？
(1)硬腦膜上(外)出血 (2)硬腦膜下(內)出血 (3)蜘蛛膜下腔出血 (4)顱內出血。
41. [] 【3】 以鼻導管供給氧氣，如流速為 6 公升／分鐘，則病人吸入氣體中的氧濃度約為多少？
(1)21% (2)33% (3)45% (4)100%。
42. [] 【3】 張先生患有慢性阻塞性肺疾病需教導採用噉嘴呼吸的主要目的為下列何者？
(1)可鬆動並促進呼吸道痰液的咳出 (2)可增加吸氣，改善肺部氧合 (3)可預防呼吸道塌陷，促進吐氣 (4)可降低潮氣容積，增加病人對呼吸的自我控制感。
43. [] 【4】 丁先生被診斷為肺結核其應採之治療敘述，下列何者正確？
(1)避免同時使用 2 種以上抗結核藥物，以減少藥物的拮抗性
(2)治療期間，一次痰液培養為陰性，即可確定不具傳染性
(3)藥物治療時間應持續 3 個月，預防抗藥性發生
(4)開放性肺結核病人最好在發病 2 週內入住負壓隔離病房。
44. [] 【1】 尤先生突發胸痛被診斷為張力性氣胸，身體檢查結果之敘述，下列何者正確？
(1)觸診氣管偏向健側 (2)兩側胸廓擴張性呈現對稱性減少 (3)患側觸覺震顫增強 (4)聽診患側出現爆裂音。
45. [] 【2】 評估疑似肺栓塞病人時，最可能發現下列何種症狀？
(1)突然發冷、發燒 (2)突然胸痛 (3)出現噉嘴式呼吸 (4)出現泡沫痰。
46. [] 【4】 當車廂旅客過多卻突然斷電空調無法運作時，因缺氧導致低血氧最早會出現的精神狀態改變，下列何者正確？
(1)昏迷 (2)嗜睡 (3)欣快感 (4)躁動不安。
47. [] 【1】 若未出現腦脊髓液滲漏之頭部外傷者，應採何種臥姿休息？
(1)30-45 度半坐臥位 (2)平躺 (3)垂頭仰臥 (4)俯臥。
48. [] 【3】 頭部外傷後若出現下列哪些狀況須盡速就醫？A. 常出現頭痛或原有頭痛加劇 B. 昏睡 C. 視覺模糊不清 D. 失眠
(1)AC (2)BD (3)ABC (4)ABCD。

臺北捷運公司 113 年 7 月 28 日新進技術專員(護理類)

甄試試題-護理學

49. [] 【4】 使用機械式胸外按壓儀器時機下列何者錯誤?
(1)時間過長的心肺復甦 (2)在行駛中的救護車 (3)低體溫所致心臟停止 (4)胸腔創傷胸骨骨折。
50. [] 【1】 有關毒蛇咬傷護理措施中，下列何者正確？A. 密切監測傷口腫脹情形 B. 監測傷肢末端脈搏搏動情形 C. 固定傷肢 D. 在傷肢上使用冰敷減輕疼痛。
(1)ABC (2)BCD (3)ACD (4)ABCD