

等 別：高等考試
類 科：營養師
科 目：公共衛生營養學
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50分）

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
- (二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
- (三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

- 一、近年傳染病防治之公共衛生議題備受重視。請試述傳染病發生之要素，並說明營養於預防傳染病流行之重要性。（20 分）
- 二、根據國民營養健康狀況變遷調查（106~109 年），調查結果顯示國人仍面臨飲食攝取不均，營養失衡問題。請試述國人目前面臨何種營養問題？並擬一營養改善計畫，內容說明此營養問題之評估方法與飲食營養相關策略。（20 分）
- 三、請試述下列名詞之意涵：（每小題 5 分，共 10 分）
 - (一) Acceptable Macronutrient Distribution Ranges
 - (二) Tolerable Upper Intake Levels

乙、測驗題部分：（50分）

代號：5103

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案。
 - (二)共40題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。
- 1 根據國民飲食指標當中「多蔬食少紅肉，多粗食少精製」，下列敘述何者錯誤？
 - (A)比起動物性食物，植物性食物對健康較有利，且可降低氣候暖化效應
 - (B)比起粗食，精製食物有較多空熱量，且營養素含量較低
 - (C)未精製的植物性食物，包括蔬菜、堅果、與白飯
 - (D)以烤地瓜取代洋芋片，符合該指標
 - 2 某人今日攝取一杯含 15 公克添加糖之珍珠奶茶與一份含 5 公克添加糖的點心，假設他每日熱量需求為 1500 大卡。依據民國 107 年的國民飲食指標建議，下列對於他的飲食建議，何者正確？
 - (A)添加糖攝取熱量占總熱量未超過建議值 10%
 - (B)添加糖攝取熱量占總熱量未超過建議值 15%
 - (C)添加糖攝取熱量占總熱量未超過建議值 5%
 - (D)若總醣類的攝取熱量占總熱量在 50~60%範圍，就無須限制添加糖
 - 3 第八版國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）之修訂原則，下列何者正確？
 - (A)熱量建議依身體活動分「稍低」與「適度」二級
 - (B)調降 12 歲以前的鐵上限攝取量（UL）至 35 mg
 - (C)嬰兒年齡分層為 0~6 個月與 7~12 個月
 - (D)增列維生素 D 建議量

- 4 有關包裝食品營養宣稱應遵行事項之敘述，下列何者正確？
(A)品名為「乳酸菌糖果」或「乳酸菌球飲料」，是營養宣稱的範圍
(B)品名為「OO 維生素 C 飲料」，得在營養標示欄位內標示維生素 C 含量
(C)對產品原料成分敘述有「維生素 A」、「維生素 B₂」，是屬於營養宣稱
(D)捕撈之深海魚類包裝食品，可在產品包裝上宣稱「富含 DHA 與蛋白質」
- 5 依據校園飲品及點心販售規範，下列何種飲品及點心無法於高級中等以下學校販售？
(A)每份所提供的脂肪占總熱量 35% 的全脂鮮奶
(B)每份添加糖占總熱量超過 10% 的優酪乳
(C)每份含有 0.5 公克反式脂肪的餅乾
(D)每份鈉含量 300 毫克的麵包
- 6 有關嬰兒副食品的添加，下列敘述何者正確？
(A)純母乳哺育者，嬰兒 6 個月後必須添加副食品，避免營養不良
(B)以母乳替代品（配方奶）哺育者，嬰兒 3 個月後必須添加副食品，避免營養不良
(C)添加副食品宜循序漸進，可由不易引起過敏的蛋類開始
(D)為增加嬰兒對於副食品的適應性，可酌量用鹽、糖調味
- 7 有關長者健康整合式評估（Integrated Care for Older People, ICOPE），下列敘述何者錯誤？
(A)世界衛生組織在民國 108 年所公布的 ICOPE 照護指南，希望早期發現長者功能衰退，以延緩衰弱與失能，維持及改善老年人身體功能與心理健康
(B)依據衛生福利部國民健康署民國 108 年「長者衰弱評估」篩檢結果，85 歲以上長者每 4 人有 1 人可能衰弱
(C)ICOPE 含生理功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱等 6 大項目
(D)能否在 12 秒內，雙手抱胸連續起立坐下 5 次；過去 3 個月體重是否突然減少 3 公斤以上；過去 2 週是否覺得心情低落沮喪、沒有希望等，都是 ICOPE 評估的內容
- 8 依據國際母乳代用品銷售守則（International code marketing of breast-milk substitutes）建議，醫護人員可接受配方奶公司所提供的下列那種物品？
(A)嬰兒餵食指南的資料
(B)母乳哺育的衛教資料
(C)免費嬰兒毛巾或浴巾
(D)跟配方奶有關的科學實證資訊
- 9 世界衛生組織於 2021 年修訂之評估「嬰幼兒餵食指標（Indicators for infant and young child feeding practices）」不包括下列何項？
(A)6 到 8 個月大嬰幼兒開始餵食副食品的比例
(B)6 到 23 個月大嬰幼兒最低用餐頻率
(C)6 到 23 個月大嬰幼兒攝取含鐵或富含鐵質食物的比例
(D)6 到 23 個月大嬰幼兒攝取含糖飲料的比
- 10 針對美國老人的營養主動檢查計畫（Nutrition screening initiative, NSI），下列何者不是 DETERMINE 檢核表的項目？
(A)抽菸、喝酒
(B)飲食貧乏、不自主體重減輕或增加
(C)疾病、缺牙、口腔疼痛、多重用藥
(D)經濟困難、缺乏社交互動、需要照顧協助、高齡者
- 11 有關包裝食品營養標示應遵行事項之敘述，下列何者正確？
(A)市售經保鮮膜包裝之滷味豆干，須營養標示
(B)營養標示中，孕乳婦每日熱量攝取參考值為 2000 大卡
(C)包裝維生素礦物質類之錠狀、膠囊狀食品，不適用本規定
(D)營養標示中的反式脂肪，係指食用油經部分氫化過程所形成的非共軛式反式脂肪酸
- 12 某病人生化檢驗後發現「前白蛋白偏低、白蛋白正常」，此病人目前之營養狀況為何？
(A)嚴重營養不良，需積極營養介入
(B)早期營養不良，需適當飲食治療
(C)營養狀況已獲改善，逐漸恢復正常
(D)營養狀況良好，不需任何營養介入

- 13 有關食物頻率問卷的敘述，下列何者錯誤？
(A)常用來評估個人長期的飲食狀況 (B)結果容易有系統誤差
(C)食物選項多，不易填答 (D)結果無季節性差異
- 14 衛生福利部國民健康署公布之代謝症候群，與體位相關的指標為何？
(A) Body mass index (B) Hip circumference (C) Ideal body weight (D) Waist circumference
- 15 下列何種評估方式無法了解鐵質之營養狀況？
(A) Hemoglobin (B) Transferrin (C) Serum iron (D) Transaminase
- 16 色胺酸負荷試驗 (Tryptophan load test) 是用以評估下列那一種營養素狀況？
(A)維生素 B₁₂ (B)維生素 B₆ (C)維生素 B₂ (D)維生素 B₁
- 17 迷你營養評估問卷 (Mini Nutritional Assessment, MNA) 不包括下列何項營養評估項目？
(A)行動能力 (B)飲食評估 (C)體位測量 (D)生化分析
- 18 有關 24 小時飲食回憶法的敘述，下列何者正確？
(A)適用於推估群體的膳食攝取狀況 (B)可了解個人在群體間的飲食攝取情形
(C)一天的資料可代表受訪者的飲食情形 (D)回憶的食物項目通常較飲食紀錄法完整
- 19 欲了解國中生前一學年含糖飲料攝取狀況，下列那種飲食評估方法最適合？
(A)飲食紀錄 (B)食物頻率問卷 (C)食物秤重盤存法 (D) 24 小時飲食回憶
- 20 下列何者不為 Malnutrition risk scale (SCALES) 營養評估量表的特點：
(A)專為門診病人設計 (B)病人情緒沮喪為評量指標
(C)三酸甘油酯為評量指標 (D)可用於老年人營養評估
- 21 結構性訪問調查的訪員遵循原則，下列何者錯誤？
(A)按照訪問表上的題目語句發問
(B)依照訪問表上的題目順序發問
(C)可先與受訪者談論天氣、個人興趣等話題，以使氣氛融洽，再進入正題
(D)當受訪者回答出正確答案時，可適時表達贊同，以鼓勵受訪者繼續作答
- 22 問卷 (或量表) 發展過程中，下列何者不是專家審查的目的？
(A)檢視能否測量到真正想測得的概念和想法 (B)檢視是否對應到測量變項的內涵
(C)檢視測量尺度是否恰當 (D)檢視內部一致性
- 23 王先生 65 歲，初次診斷為糖尿病，下列敘述何者為較佳的營養諮詢訪談方式？
(A)請問您自從知道罹患糖尿病後，在飲食上您想要知道什麼？
(B)您目前罹患第 2 型糖尿病，應注意高升糖指數的食物攝取
(C)請問您目前依然每天喝含糖飲料嗎？
(D)第一步先教他食物代換表份數之換算
- 24 下列那一種學習層級不屬於情意領域 (Affective domain) ？
(A)理解 (Comprehension) (B)接受 (Receiving)
(C)反應 (Responding) (D)價值判斷 (Valuing)
- 25 跨理論模式中，行為改變需要改變多久才進入維持期 (Maintenance) ？
(A) 1 個月 (B) 3 個月 (C) 6 個月 (D) 9 個月
- 26 諮商過程中聽到個案說：「我有必要開始控制飲食，需要做一些改變，但我要怎麼進行呢？」。此個案正處於：
(A)意圖期 (Contemplation) (B)準備期 (Preparation)
(C)行動期 (Action) (D)猶豫期 (Hesitation)

- 27 社區營養計畫中寫出：透過 DASH 飲食教育計畫，可使七成的高血壓病人了解飲食對血壓控制的重要性，此屬於下列何種計畫目標？
(A)過程目標 (B)結構目標 (C)結果目標 (D)中期目標
- 28 評估社區營養計畫，步驟依序為何？①根據實施準則執行 ②確認結果指標及完成的標準 ③評估成功率 ④訂定執行準則 ⑤依據結果有所行動
(A)①②③④⑤ (B)④②①③⑤ (C)②⑤③④① (D)④①②⑤③
- 29 社區營養計畫書通常不包含下列何者？
(A)計畫主旨與背景分析 (B)人力配置與經費需求
(C)魚骨圖 (Fishbone diagram) (D)甘特圖 (Gantt chart)
- 30 下列何者屬於社區營養計畫的過程評估？
(A) 30 人的體重控制計畫方案須花費 10 萬元，體重下降後可使醫療資源節省 50 萬元
(B)糖尿病共同照護網計畫共花費 100 萬元，介入後 70% 的病人血糖降低，節省健保支出約 150 萬元
(C)社區中 90% 的第 2 型糖尿病高危險群完成篩選
(D) 150 位接受營養諮詢的糖尿病人中，120 人血糖降到目標值 (80%)
- 31 依據民國 102~105 年臺灣國民營養健康狀況變遷調查結果，有關碘的營養狀態，下列何者正確？
(A)生育年齡女性所攝取的碘，無法滿足懷孕期碘的需要
(B)由尿碘的中位數顯示，國人 31 歲以下有碘攝取不足之慮
(C)由尿碘的中位數顯示，國人碘的營養狀態，有隨著年齡增長而增加的趨勢
(D)世界衛生組織訂定的標準，將尿碘濃度 $100 \text{ mg/L} \leq$ 尿碘濃度 $< 199 \text{ mg/L}$ ，定義為充足
- 32 依據民國 102~105 年臺灣國民營養健康狀況變遷調查結果，有關國人飲食攝取份數嚴重不足不包括下列何者？
(A)蔬菜類 (B)乳品類 (C)全穀雜糧類 (D)堅果種子類
- 33 我國代謝症候群判定標準，下列敘述何者正確？
(A)女性腰圍 $\geq 80 \text{ cm}$ (B)男性腰臀比 ≥ 0.9
(C)男性高密度脂蛋白膽固醇 $\geq 40 \text{ mg/dL}$ (D)女性低密度脂蛋白膽固醇 $\geq 160 \text{ mg/dL}$
- 34 根據民國 102~105 年臺灣國民營養健康狀況變遷調查結果發現，那一種脂溶性維生素於兩性 7 歲以上各年齡層之平均攝取量皆未達建議攝取量？
(A)維生素 A (B)維生素 D (C)維生素 E (D)維生素 K
- 35 根據 2015 年聯合國永續發展議程，預定於何年達到消除飢餓，實現糧食安全之目標？
(A) 2025 (B) 2030 (C) 2035 (D) 2040
- 36 飲食指標中，下列何者與糧食永續性無關？
(A)多蔬食少吃肉 (B)選擇清淡飲食少吃醃製食品
(C)購買在地當季食材並留意份量 (D)儘量以母乳哺育嬰兒至少 6 個月
- 37 針對已感染及未感染嚴重特殊傳染性肺炎者，訪問其肺炎流行前的飲食習慣，分析後發現越符合植物性飲食型態者，得到該病的比例越低。此研究採那一種研究設計方法？
(A)營養調查 (Nutrition survey) (B)橫斷性研究 (Cross-sectional study)
(C)病例對照研究 (Case control study) (D)世代追蹤研究 (Cohort study)
- 38 有關篩檢工具的效度測量中，敏感度 (Sensitivity) 是指？
(A)真陽性率 (B)真陰性率 (C)偽陽性率 (D)偽陰性率
- 39 訪員甲面訪所得之飲食資料傾向於高估受訪者實際攝取量，而訪員乙則傾向於低估。這類問題屬於那一類的測量誤差？
(A)隨機誤差 (B)系統誤差 (C)回憶誤差 (D)抽樣誤差
- 40 衛生福利部國民健康署推廣天天五蔬果活動，其目的為下列何者？
(A)促進健康 (B)特殊防護 (C)限制殘障 (D)早期診斷與適當治療