

101年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師考試暨普通考試護士考試、101年專門職業及技術人員高等考試中醫師（第一試）考試分試考試、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：4109
頁次：8-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：產兒科護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)禁止使用電子計算器。

- 依據丹佛 II 嬰幼兒發展篩檢測驗，90%的 18 個月幼兒可達成的項目之敘述，下列何者正確？
(A)可以用杯子喝水 (B)會劃直線不偏離 30 度
(C)會辨認顏色 (D)會上樓梯
- 3 個月大的小芳，體重 7 公斤，現只喝 14%的嬰兒配方奶，為滿足其熱量需求，小芳 1 天需攝取多少 c.c.的奶量？
(A) 1365 c.c. (B) 1155 c.c. (C) 945 c.c. (D) 770 c.c.
- 有關兒童虐待的敘述，下列何者正確？
(A)以家庭為中心，進行全家性的會談
(B)發現兒童被虐待的行為應於 48 小時內向主管機關報備
(C)醫護人員需要依收集到的資料，確認施虐者
(D)虐待兒童行為確立後，需提供保護措施，預防進一步傷害
- 有關兒童急救常用藥物之敘述，下列何者正確？
(A) Epinephrine hydrochloride 注射後，心跳會變緩慢
(B) Atropine sulfate 是屬交感神經抑制劑，用於增加心輸出量
(C) Sodium bicarbonate 可用於鹼血症，是酸鹼平衡之緩衝劑
(D) Dopamine 作用於 α 接受器，可增加心輸出量
- 4 歲的兒童已完成大小便訓練，但在住院期間卻把大便解在尿片上，此種行為是屬於？
(A)控制行為 (B)退化行為 (C)退縮行為 (D)攻擊行為
- 下列那一個年齡層的孩子，會開始用具體語言表達其內心對死亡的恐懼？
(A)幼兒期 (B)學齡前期 (C)學齡期 (D)青少年期
- 為 4 歲兒童進行肌肉注射前，下列溝通的方法何者較不適當？
(A)以玩偶解釋注射過程及需注射的原因
(B)藉著遊戲讓其以第三者的角色，表達對打針的感受
(C)藉著說故事的方法，告訴其要勇敢，一下子就過去了
(D)可運用繪畫方法，表達其對醫療措施的認識與想法
- 王小弟，4 歲，入院接受疝氣手術治療，下列那項護理措施較不適當？
(A)注射後使用膠布覆蓋注射部位
(B)應避免使用「切除」、「切開」等字眼來解釋病情
(C)使用 10 公分數字量表評估疼痛程度
(D)運用遊戲方式讓王小弟表達手術後疼痛感受

- 9 給予兒童口服藥，下列何者錯誤？
- (A)可讓兒童自行選擇要吞藥丸或磨成粉末
 - (B)將藥丸置於舌尖以利吞嚥
 - (C)除非藥物有特別禁忌，否則可與少量兒童喜歡吃的食物混合
 - (D)不要將藥物倒入牛奶，因為可能造成兒童拒喝牛奶的結果
- 10 楊小妹足月出生後第 4 天，全血膽紅素值為 17 mg/dL，接受照光治療，下列護理措施何者正確？
- (A)為加速血中膽紅素的排除，應全天照光不可中斷
 - (B)母乳會增加黃疸的嚴重性，此時應停止母乳哺餵
 - (C)體溫會微上升，需增加 25%的水分
 - (D)為使其安靜照光，通常會給予 Luminal
- 11 許小妹，妊娠週數 36 週又 1 天，出生體重 2475 公克，為晚早產兒（late preterm infants），目前生命徵象穩定，每 3~4 小時哺餵母乳，消化排便正常，有關許小妹的發展描述及照顧，下列敘述何者正確？
- (A)因體重接近足月兒且目前情況穩定，可進入一般嬰兒室照顧
 - (B)因接近足月兒，晚早產兒各系統的發展較為成熟，能有效的適應子宮外的環境
 - (C)比起較小的早產兒，晚早產兒有較低的死亡率，應告訴父母不需太過緊張
 - (D)晚早產兒罹病率高，應密切照顧，並支持其各種感官及腦部的發展
- 12 林小弟，妊娠週數 25 週又 6 天，呼吸喘且費力、胸部 X-ray 呈現不成熟的肺，偶有呼吸暫停的現象，有關早產兒呼吸問題的照護處理，下列敘述何者正確？
- (A)評估呼吸窘迫的嚴重度，應以觀察腹部起伏為主
 - (B)應由靜脈注射補充表面張力素，以改善呼吸
 - (C)氧氣治療最好能維持血氧濃度達 95~100%
 - (D)如果呼吸過喘應避免給予餵食，以免嗆奶吸入肺內
- 13 維持癌症末期病童身體的舒適以及生活品質最首要的工作是：
- (A)溝通
 - (B)症狀控制
 - (C)滿足願望
 - (D)安排喪禮
- 14 有關末期病童的疼痛控制，下列敘述何者正確？
- (A)依循醫囑定時給予止痛藥，並視需要隨時加重劑量
 - (B)需嚴格監控止痛藥的劑量，避免超過上限而造成成癮
 - (C)使用鴉片類藥物時，需注意腹瀉等合併症的發生
 - (D)給予高劑量鴉片類藥物，會加速病童的死亡
- 15 有關水痘（Chickenpox; Varicella）的敘述，下列何者正確？
- (A)皮疹首先出現在四肢，然後到臉及軀幹，呈離心性分布
 - (B)避免雷氏症候群，只能給水楊酸製劑藥物
 - (C)病童在急性期應臥床休息與嚴密隔離措施
 - (D)膿疱最後凝成痂皮，痂皮乾燥後仍具傳染力
- 16 王太太帶 4 個月大的妮妮到健兒門診接種預防注射，妮妮過去均依照時程完成接種，依照我國現行預防接種時程，今天妮妮會接受以下那一種疫苗？
- (A) B 型肝炎疫苗
 - (B)白喉、破傷風、非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺，五合一疫苗
 - (C)日本腦炎疫苗
 - (D)麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗

- 17 有關腸病毒群感染之敘述，下列何者正確？
(A)經由飛沫及接觸傳染 (B) 5歲以下兒童應接種腸病毒疫苗
(C)主要症狀為腸胃炎 (D)以抗生素治療效果最佳
- 18 有關外因性（過敏原）氣喘（Asthma）診斷性檢查的敘述，下列何者正確？
(A) IgG 免疫球蛋白值上升
(B)血液檢查時，嗜伊紅性白血球（eosinophilia）總數增加
(C)聽診胸腔可發現細小的吸氣末期囉音（rales）
(D)胸部 X 光放射線檢查顯現呼吸窘迫現象
- 19 3個月大的嬰兒接受唇裂修補術後，宜採下列何種約束法？
(A)手肘帶約束法 (B)床護帶約束法 (C)結繩約束法 (D)木乃伊約束法
- 20 肺量計（spirometry）可測得兒童之第一秒用力呼氣容積（force expiratory volume, FEV₁）及用力肺活量（force vital capacity, FVC），其FEV₁/FVC的數值為多少，代表兒童之肺功能正常且無氣流阻塞情形？
(A)大於 80% (B) 60~79% (C) 50~59% (D) 40~49%
- 21 李小妹，9歲，做扁桃腺切除，術後 2 小時，意識清醒，不斷有吞嚥動作，並表示喉嚨疼痛。下列何種措施錯誤？
(A)請李小妹頭側向一邊，並檢查咽喉部傷口 (B)給李小妹局部冰敷或含少量冰塊
(C)評估疼痛強度，並依醫囑給予止痛劑 (D)使用抽痰設備，自口、鼻抽吸分泌物
- 22 有關失神性發作（absence seizure）的敘述，下列何者正確？
(A)發作時，會有數秒鐘動作停止 (B)臉部半邊抽搐，發出怪聲
(C)會出現尿失禁 (D)發作後會有嗜睡情形
- 23 有關胎兒出生後心臟血管系統的改變，下列敘述何者錯誤？
(A)肺臟血管阻力增加 (B)全身血管阻力增高
(C)臍靜脈閉合會形成肝圓韌帶 (D)卵圓孔出生後會功能性閉合
- 24 正常情況下，兒童由全身各組織循環回心臟之血液含氧量大約為多少？
(A) 60~65% (B) 70~75% (C) 80~85% (D) 90~95%
- 25 妮妮，5個月大嬰兒，體重 5.4 公斤，血紅素 9.6 gm/dL、血比容 30%、血清鐵質濃度為 25 µg/dL，經醫師確診為缺鐵性貧血，開始接受治療。母親擔心地表示妮妮一向食慾不佳，只喜歡喝牛奶、果汁，經常拒食鐵劑。在此情形下，下列護理指導何者較為適當？
(A)建議母親準備高熱量奶製品與鐵劑混合餵食
(B)建議母親與醫師討論考慮使用肌肉注射鐵劑
(C)建議母親以小滴管餵食鐵劑後，再給予柳橙、蕃茄等果汁
(D)建議母親準備葡萄乾、麥片粥、牛肉菠菜粥等富含鐵質之副食品
- 26 有關 β 型海洋性貧血（β-Thalassemia）患童的敘述，下列何者錯誤？
(A)屬體染色體隱性遺傳疾病
(B)出生後即出現明顯的、嚴重的溶血性貧血症狀
(C)病童需終身定期輸血，維持血色素>10 gm/dL
(D)長期輸血病童，需給予排鐵劑，以防血鐵質沉著症

- 27 下列何者不是我國兒童常見的健康問題？
(A)齲齒 (B)發展遲緩 (C)視力問題 (D)頭蝨
- 28 有關學齡期罹患骨肉瘤病童接受截肢手術後的護理照護，下列何者較不適當？
(A)手術後殘肢應立即以彈性繃帶固定，以預防攣縮
(B)鼓勵病童即早下床活動，強化自我的能力，即早得到心理適應
(C)教導兒童及家人殘肢的照顧方式及義肢的使用情形，即早開始復健治療
(D)避免與病童談及生活方式的改變及失落，因為其對自我認識並未成熟
- 29 小青，16 歲，剛被診斷罹患第一型糖尿病，有關其護理指導，下列敘述何者錯誤？
(A)青春期因生長激素分泌旺盛，較不易維持血糖穩定
(B)協助避免課業壓力所引發的低血糖症狀
(C)父母若能參與症狀處理則有助小青適應疾病
(D)協助參加病友夏令營學習自我照顧技巧
- 30 小尼，11 歲，有躁動不安、心悸等現象，經診斷為甲狀腺機能亢進（Hyperthyroidism），有關服藥治療的護理指導，下列何者適當？
(A)需定期到醫院接受血液及肝功能檢查 (B)若出現肌肉無力，宜加強肌力訓練
(C)服藥 1~3 年後，症狀才會改善 (D)只要症狀改善就可以停止服藥
- 31 小輝，4 歲，每天起床時，都發現其眼睛四周浮腫，但到下午時便消失。日前因出現全身水腫、呼吸喘，診斷為腎病症候群（Nephrotic syndrome）。有關小輝的檢查，下列何者不是腎病症候群的診斷依據？
(A)高膽固醇血症 (B)蛋白尿 (C)低白蛋白血症 (D)血尿
- 32 為新生兒做健康評估時，發現有尿道下裂的狀況，下列何者為尿道下裂的特徵？
(A)尿道開口在龜頭的中央 (B)陰莖向背側彎曲
(C)多處尿道開口 (D)尿道開口在陰莖腹側
- 33 小涵，6 歲，因泌尿道感染住院，有關住院護理指導，下列敘述何者不適當？
(A)抗生素需連續服用 14 天
(B)鼓勵小涵即使在上課中途想尿尿也要告知老師去解尿
(C)解尿後用面紙或衛生紙由前往後擦拭會陰部
(D)多喝汽水，以促進酸化尿液之作用
- 34 小萍，2 個月大，有腹部脹氣及嘔吐情形，確立診斷為先天性巨結腸症，下列相關手術前後的醫護處置何者正確？
(A)手術前腸道準備時，需採肥皂水進行清潔灌腸
(B)通常採兩階段方式的手術治療，其間應相隔 1 個月左右
(C)若更換造瘻口袋而造成持續出血，需立即就醫
(D)結腸造瘻口手術後應採高渣、高熱量、高蛋白飲食
- 35 有關疝氣之敘述，下列何者正確？
(A)臍疝氣隨著小孩體重增加會更趨嚴重
(B)腹股溝疝氣若局部出現紅、硬且疼痛時，必須及早手術
(C)橫膈疝氣絕大部分為間接疝氣，因此只需做疝氣囊高位結紮
(D)腹股溝疝氣發生率，男女的比例為 1：5

- 36 有關顱內壓升高病童的護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A)減少病童周圍環境的聲光刺激 (B)限制水分攝取，但需維持體液電解質平衡
(C)靜脈輸注 glycerol 時，應在 20 分鐘內輸畢 (D)維持呼吸道通暢時，避免使用背部叩擊
- 37 小豪，6 歲，因頭部外傷自急診入院，依據兒童適用之葛氏昏迷量表（Glasgow coma scale, GCS）評估其意識程度，結果發現其聽到聲音會睜眼，出現說話含糊不清，給予痛刺激時能屈曲手臂，請問其昏迷指數為幾分？
(A) 8 分 (B) 9 分 (C) 10 分 (D) 11 分
- 38 小豪，14 歲，因脊椎損傷造成尿瀦留，需要自己執行間歇性清潔導尿，有關其照護指導之敘述，下列何者錯誤？
(A)設計每日的飲水計畫，避免在短時間內暴飲過多水分
(B)約每隔 3 至 4 小時就需執行一次導尿，避免泌尿道感染
(C)禁用抗乙醯膽鹼藥（Anticholinergic drug），避免尿瀦留
(D)可以使用克雷德氏法（Crede's method）壓迫膀胱幫助排尿
- 39 陳小弟因下肢骨折需上石膏，下列有關上石膏後的立即護理，何者不恰當？
(A)向病童及家屬解釋剛上石膏時會覺得溫熱 (B)敷石膏的肢體應平放，以便內外均能乾燥
(C)確保石膏的邊緣平滑且無刺激皮膚的突出面 (D)評估敷石膏肢體末稍的脈搏、膚色及溫度
- 40 有關兒童燒傷後，最初休克期之緊急處置目標，下列敘述何者不適當？
(A)使用乳酸林格氏溶液（Lactated Ringer's solution）補充水分及電解質
(B)吸入性灼傷之兒童，須維持呼吸道通暢
(C)以肌肉注射給予止痛劑，控制疼痛
(D)以無菌技術處理燒傷部位，預防感染
- 41 有關「總生育率」的敘述，下列何項正確？
(A)每千位婦女自 15 歲開始，依照當年的年齡別生育率，到年滿 50 歲之前合計生育的子女數
(B)每百位婦女自 16 歲開始，依照當年的年齡別生育率，到年滿 48 歲之前合計生育的子女數
(C)每萬位婦女自 18 歲開始，依照當年的年齡別生育率，到年滿 51 歲之前合計生育的子女數
(D)每萬位婦女自 20 歲開始，依照當年的年齡別生育率，到年滿 55 歲之前合計生育的子女數
- 42 依據我國優生保健法施行細則規定，除醫療行為外，人工流產應於妊娠幾週內施行？
(A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 24
- 43 李女士現在懷孕 20 週，下列那一個妊娠變化是屬於確實徵候？
(A)有布雷希式子宮收縮（Braxton Hicks contraction）
(B)有妊娠紋、褐斑
(C)有監測到胎心率
(D)感覺有胎動
- 44 正常孕婦的一般常規檢查，不包括下列何者？
(A)梅毒血清試驗（VDRL） (B)全血球計數（CBC）
(C)ABO 及 Rh 因子之辨認 (D)口服葡萄糖耐量試驗（OGTT）
- 45 高女士，33 歲，孕產史 G₂P₁，現懷孕 15 週，依醫囑進行母血唐氏症篩檢，其抽血檢驗項目主要為何？
(A)α 胎兒蛋白、人類絨毛膜性腺激素（HCG） (B)α 胎兒蛋白、人類胎盤泌乳激素（HPL）
(C)β 胎兒蛋白、人類絨毛膜性腺激素（HCG） (D)β 胎兒蛋白、雌性二醇（E₂）
- 46 懷孕婦女在懷孕過程中會積極參加產前媽媽教室，並開始學習如何替嬰兒換尿布，此為何種母性認同之行為表現特點？
(A)角色扮演 (B)模仿 (C)內射、外射 (D)認同

- 47 馬女士剛發現懷孕不久，對於是否可以進行性行為感到不安，您是她的主護護理師，下列何項有關孕婦性生活的護理指導較為適當？
(A)懷孕後的前3個月及最後3個月不宜性交，以避免早產或流產
(B)懷孕期間若無特殊危險徵兆，維持適當的性生活是可允許的
(C)性高潮會引起子宮收縮，可能影響胎兒故建議最好禁慾
(D)妊娠第二期因骨盆腔充血，性高潮可能使孕婦產生子宮收縮應避免
- 48 王女士，懷孕5次，足月生產2次，人工流產2次，自然流產1次，請問其孕產史應紀錄為何？
(A)G₅P₁A₃ (B)G₅P₃A₂ (C)G₅P₂A₃ (D)G₅P₃A₁
- 49 男性睪丸在胚胎時期原在腹腔中，約在妊娠何時開始通過腹股溝管進入陰囊？
(A)妊娠5個月 (B)妊娠7個月 (C)妊娠9個月 (D)妊娠10個月
- 50 護理師發現引產中婦女的羊水呈棕綠色，應優先採取何項措施？
(A)立刻報告醫師 (B)教導深呼吸放鬆 (C)限制輸入液體量 (D)暫停催產素靜脈注射
- 51 比夏計分系統（Bishop score）評估，分數至少要達幾分，引產才較容易成功？
(A)3 (B)6 (C)9 (D)12
- 52 陳女士因規律宮縮而入院待產，陰道內診結果子宮頸擴張約2 cm，此時護理師可以引導她做那一種呼吸方法？
(A)喘息－吐氣式呼吸 (B)緩慢的胸式呼吸 (C)吹蠟燭運動 (D)淺吸式胸部呼吸法
- 53 下列何者為待產婦之異常症狀與徵象？
(A)子宮頸口開9公分，待產婦有不自主向下用力的感覺
(B)子宮頸口全開，宮縮時用力胎頭會下降
(C)宮縮時間超過90秒，且10分鐘內宮縮壓力小於10 mmHg
(D)子宮頸口全開，已經用力30分鐘，但是胎兒尚未娩出
- 54 張女士第一胎，子宮頸全開，用力時胎頭高度為+3，胎心音出現晚期減速，此時最合宜的處置為何？
(A)做剖腹生產的準備 (B)請產婦繼續用力，使用真空吸引協助娩出
(C)正常反應，繼續觀察 (D)協助產婦姿勢改變
- 55 胎頭在外迴轉時，此時肩部進行：
(A)內迴轉 (B)屈曲 (C)下降 (D)伸展
- 56 足月時，胎位為ROA之胎兒，胎心音可在母親腹部何處聽得最清楚？
(A)左上象限 (B)右上象限 (C)左下象限 (D)右下象限
- 57 有關使用催產素引產的敘述，下列何者正確？
(A)可採用靜脈點滴輸注方式給予 (B)有利尿作用，須嚴防脫水現象
(C)劑量以不超過10 mU/min為限 (D)會造成高血壓的副作用
- 58 王太太產後哺餵母乳時，常感覺下腹部疼痛，此時最可能的原因為：
(A)因為膀胱脹造成下腹部疼痛 (B)因為便秘造成下腹部腸道疼痛
(C)因為泌乳素分泌造成子宮收縮痛 (D)因為催產素分泌造成子宮收縮痛
- 59 黃女士G₁P₁自然生產，產前曾參與媽媽教室，於產後第二天已開始由關心自己的需要，轉移至新生兒身上，主動參與學習如何照顧新生兒。黃女士的行為特性是處於下列何項時期？
(A)接受期（taking-in phase） (B)緊執期（taking-hold phase）
(C)放手期（letting-go phase） (D)獨立期（independent phase）
- 60 李女士產後1個月，惡露由淡黃色轉為紅色，腹部觸診無疼痛現象，最常見的原因及處理為何？
(A)正常生理現象，不需理會 (B)產道受傷，需立即就醫
(C)燉補湯喝太多，停餐即可 (D)子宮復舊不全，需就醫診療

- 61 有關剖腹產後陰道生產（vaginal birth after cesarean section, VBAC）的敘述，下列何者錯誤？
(A)前一胎剖腹產採子宮上段切開，則此胎不鼓勵行 VBAC
(B) VBAC 可避免造成骨盆腔粘黏
(C) VBAC 能增加正向的生產經驗
(D)前胎是胎兒窘迫而剖腹產者，此胎不宜行 VBAC
- 62 下列指導哺乳期婦女獲取適當營養的敘述，何者錯誤？
(A)每日的熱量需求較平時增加 500 大卡
(B)每日需強迫攝取 3000 c.c.的水分
(C)每日蛋白質宜增加 12~15 公克
(D)完全素食者需補充維生素B₁₂
- 63 黃女士G₁P₁，產後第 3 天已順利開始哺餵母乳，今天將和寶寶一起出院，下列指導何者正確？
(A)餵完奶後把餘奶完全擠出
(B)乳頭破皮嚴重時，仍應繼續直接哺餵母乳
(C)擠乳時間每次勿超過 15 分鐘
(D)可將她轉介到社區的母乳支持團體
- 64 黃女士G₂P₁，2 天前生下一位 18 對染色體異常新生兒，下列何項行爲，可能表示其親子依附關係有問題？
(A)能與新生兒眼對眼接觸
(B)能安撫新生兒並與他說話
(C)抱新生兒時沒有貼近身體
(D)願意以母乳哺餵新生兒
- 65 黃女士G₂P₂，自然生產後 42 天回門診檢查，主訴除了情緒低落、食慾睡眠變差、容易疲勞外，也覺得自己無用、無價值。此表示產婦最有可能產生下列何項情緒障礙？
(A)一般產婦均會經歷的正常現象
(B)產後低潮（postpartum blue）
(C)產後憂鬱症（postpartum depression）
(D)產後精神病（postpartum psychosis）
- 66 產後惡露主要含子宮蛻膜殘留、陰道上皮細胞、紅血球、白血球及偶有胎便、胎脂及胎毛的是：
(A)漿性惡露
(B)粉紅惡露
(C)紅惡露
(D)白惡露
- 67 有關新生兒皮膚特徵的描述，下列何者錯誤？
(A)足月兒胎脂皮膚皺褶處非常明顯，具有保護及保持體溫的功效
(B)蒙古斑常見於新生兒的薦部或臀部，在兒童早期會自行消失
(C)毒性紅斑常見於軀幹、手臂和包尿布的部位，通常局部治療即可
(D)黃疸的形成是漸進地由頭部向下以及由身體中心向外發展至四肢
- 68 胎兒一娩出，醫護人員立即將新生兒以阿帕嘉計分（Apgar Score）做評估，有關阿帕嘉計分的敘述，下列何者錯誤？
(A)依據 5 個指標評估新生兒，包括體溫、心跳、呼吸、膚色以及體重
(B)第 1 分鐘的阿帕嘉計分可顯示新生兒是否需要實行心肺復甦術
(C)藉由系統性的觀察完成阿帕嘉計分，各項紀錄為 0、1 或 2 分
(D)第 5 分鐘阿帕嘉計分 7 分以上，新生兒存活率較高
- 69 黃小妹，出生體重 3000 gm，採 24 小時母嬰同室，純母乳哺餵，於出生第 3 天體重降為 2850 gm，她的母親擔心的詢問護理師該如何處理時，下列何者為最恰當的回答？
(A)可能是產婦乳汁量不足，致黃小妹進食奶量不夠所致，應予考慮添加母乳代用品
(B)寶寶在出生後前幾天沒有什麼食慾，大部分時間都在睡覺，體重減輕是正常的現象
(C)新生兒出生後 3~4 天內會有 5~10%生理性體重喪失，目前減輕的重量在正常範圍內，不需特別處理
(D)會告知醫師，加強監測寶寶的血糖，以避免寶寶血糖過低
- 70 下列那一種免疫球蛋白在妊娠第三期中可以通過胎盤，使胎兒獲得被動免疫力？
(A) IgA
(B) IgE
(C) IgG
(D) IgM

71 林太太妊娠 32 週因重度子癩前症入院安胎，以 $MgSO_4$ 藥物治療，護理師發現林太太深部肌腱反射為 (0~+1)、呼吸速率 12 次/分、尿量減少且臉部潮紅，並主訴全身無力。下列何項為林太太狀況之正確評估？

- (A) 鎂離子中毒，應給予解毒劑
(B) $MgSO_4$ 劑量不足，應加重劑量持續治療
(C) 症狀治療之有效反應，應等劑量持續治療
(D) 症狀治療之無效反應，應予以換藥

72 下列婦女孕期感染病毒的處置陳述，何者正確？

- (A) 孕婦若為 B 型肝炎帶原者，會經由產道感染給胎兒，宜在新生兒出生後 72 小時內注射 B 型肝炎疫苗
(B) 孕婦若感染疱疹病毒 (HSV-II)，應採剖腹生產方式生產，以避免傳染給胎兒
(C) 孕婦若感染巨細胞病毒，可經由胎盤、產道傳染給胎兒，但不會經由乳汁傳染給新生兒
(D) 若欲知胎兒是否也感染德國麻疹病毒，可檢測胎兒臍帶血中之 IgG 是否過高

情況：張太太在婚前因二尖瓣脫垂嚴重而接受置換機械瓣膜，術後無身體活動上的限制，但需長期服用抗凝血劑 Warfarin (Coumadin)。依此回答下列第 73 題至第 74 題。

73 今張太太因月經過期 2 週，而至門診驗孕，結果證實張太太已懷孕，有關張太太後續可能之醫療處置敘述，下列何者正確？

- (A) 繼續服用藥物，Warfarin (Coumadin) 屬 A 級安全藥品
(B) 停用一切藥物直到生產，以防胎兒畸形
(C) 妊娠初期 3 個月改用皮下注射 Heparin Sodium (Heparin)，以防胎兒畸形
(D) 抗凝劑劑量須加倍直到生產，以防胎兒畸形

74 張太太自妊娠至產後，有關心臟負荷量最大的時間及原因之敘述，下列何者正確？

- (A) 懷孕初期；因為周邊血管阻力減少
(B) 妊娠 20~32 週；因為此時心臟搏出量達到最高峰
(C) 妊娠 36 週；因為心臟受到子宮的壓迫
(D) 產後初期；因為回心血量增加

75 李女士罹患子宮頸癌第 IIb 期，接受子宮根治術，術後可能出現的護理問題，下列何者除外？

- (A) 膀胱造瘻口滲尿
(B) 便秘與腹瀉交替出現
(C) 下肢肢體活動障礙
(D) 下肢淋巴水腫

76 護理人員教導凱格爾氏運動 (Kegel's exercise)，下列何者表示個案能正確使用骨盆底肌肉？

- (A) 深呼吸時能憋住呼吸至少 10 秒
(B) 在解尿時，能控制尿液排泄速度
(C) 憋尿時，小腹有明顯的收縮感
(D) 放在陰道口的食指感到骨盆肌的收縮

77 有關女性賀爾蒙的敘述，下列何者正確？

- (A) 動情激素會使情緒低落
(B) 動情激素可以防止熱潮紅
(C) 黃體激素可以提升精力
(D) 黃體激素可以使陰道產生潤滑液

情況：李女士，50 歲，近 6 個月出現臉潮紅、心悸、月經週期不規則、月經量少且顏色淡，進入更年期。依此回答下列第 78 題至第 79 題。

78 李女士生殖內分泌系統的變化，包括下列何者？①黃體素分泌增加 ②雌性素分泌減少 ③黃體生成素 (LH) 分泌減少 ④濾泡刺激素 (FSH) 分泌增加

- (A) ①④ (B) ②③ (C) ②④ (D) ③④

79 李女士接受賀爾蒙補充療法，下列何者為此療法之主要目的？

- (A) 緩和血管舒縮症狀 (B) 使月經週期規則化 (C) 減少靜脈血栓形成 (D) 促使情緒穩定

80 下列有關卵巢過度刺激症候群 (OHSS) 之敘述，何者錯誤？

- (A) 因使用誘發排卵藥物而發生
(B) 於排卵後 2~8 天發生，若懷孕則症狀會持續至妊娠 6~8 週才消失
(C) 使用賀爾蒙補充療法 (HRT) 而引起 OHSS
(D) 嚴重症狀者為腹水、不正常凝血功能及腎功能降低而導致少尿