

105 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、  
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、105 年專門職業及技術人員  
高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：4106  
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：產兒科護理學

考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 有關妊娠期 B 群鏈球菌感染之敘述，下列何者正確？
  - 胎兒若受到垂直感染，多在出生 7 天內發病
  - 妊娠 20 週接受羊膜穿刺術以篩檢孕期婦女是否受感染
  - 菌種經常存活在婦女的鼻腔及呼吸道
  - 預防胎兒受到感染，唯有採行剖腹生產
- 當以手指輕觸新生兒嘴角，新生兒會將臉和嘴轉向刺激物並張開嘴是何種反射表現？
  - 尋乳反射 (Rooting reflex)
  - 吸吮反射 (Sucking reflex)
  - 摩洛反射 (Moro reflex)
  - 巴賓斯基反射 (Babinski reflex)
- 以超音波推估妊娠 20 週時的胎兒週數，下列何者最適當？
  - 股骨長度 (FL)
  - 胎兒頭臀長 (CRL)
  - 雙頂徑 (BPD)
  - 頭腹圍比 (HC/AC)
- 有關全民健康保險孕婦產前檢查的服務項目與給付時程之敘述，下列何者正確？
  - 首次產檢應於妊娠 6 週以前完成
  - 妊娠至 28 週以前，應每隔兩個月檢查一次
  - 建議在 20 週進行超音波檢查
  - 妊娠第二期例行的實驗室檢查項目包括 SGOT、SGPT、creatinine 與血糖
- 蔡女士，月經週期規則，最後一次月經的第一天為今年 5 月 10 日，則按照內格萊氏法則 (Nägele's rule) 推算，蔡女士的預產期應為何時？
  - 明年 1 月 28 日
  - 明年 2 月 17 日
  - 明年 3 月 12 日
  - 明年 4 月 10 日
- 有關唐氏症候群篩檢之敘述，下列何者正確？
  - 母血篩檢值高於 1/270 時，則歸為高危險群
  - 羊膜腔穿刺合適的檢查時間是妊娠 10~16 週之間
  - 母血篩檢可作為確立唐氏症候群的診斷方法
  - 母血唐氏症篩檢加上頸部透明帶的檢測，其假陽性率高
- 有關卵子形成 (oogenesis) 的敘述，下列何者正確？
  - 女性在胎兒時期就已經開始有卵原細胞 (oogonia) 的形成
  - 卵細胞第一次減數分裂是發生在受精時
  - 形成一個單套的卵，需經過一次有絲分裂與一次減數分裂
  - 整個卵母細胞分裂的過程共產生了一個單套的卵及一個極體 (polar body)

- 8 有關胚胎與其附屬器官發育之敘述，下列何者正確？  
(A)胎盤循環始於第 6 週，故自此後胚胎稱為胎兒  
(B)受精後第 3 週的胚胎因內胚層形成，遂成為雙板胚胎  
(C)4 週大的胚胎身長約 3 公分，四肢已有芽狀突起  
(D)受精卵以囊胚的型態植入子宮內膜，完成著床
- 9 無內外科及產科疾病病史的懷孕 36 週婦女，平躺於產檢台檢查時，主訴眩暈、虛弱、冒冷汗，測得收縮壓較其原先低 30 mmHg，此時最優先的護理措施為：  
(A)給與毛毯和烤燈 (B)給與氧氣面罩 (C)協助孕婦坐於床緣 (D)協助孕婦採左側臥
- 10 有關產後生殖系統的正常變化，下列敘述何者正確？  
(A)分娩後惡露約持續 10 天，紅惡露及漿惡露交替出現  
(B)產後 3 週仍可於腹部摸到子宮底  
(C)產後約 12 小時，子宮底上升至肚臍的位置或稍高於肚臍之上  
(D)子宮約在產後 4 週，便可恢復到懷孕前的大小和形狀
- 11 下列何者為友善生產之概念？①產婦可決定生產陪伴者以獲支持 ②允許待產婦自由走動以促進舒適 ③建議使用止痛藥及麻醉劑降低不適 ④建議待產時禁食以降低生產風險  
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④
- 12 林女士，妊娠 38 週，因現血及規則宮縮待產，陰道指診結果為子宮頸口開 3 cm，變薄 40%，高度-1，未破水。詢問護理師：「我現在一定要躺在床上嗎？」，下列何者為最合適的回答？  
(A)是，避免臍帶脫出 (B)最好一直採左側臥增加胎兒氧氣供應  
(C)僅如廁時下床，其他時間應臥床 (D)沒有限制，可採您覺得舒適的臥位或下床活動
- 13 李女士，因超過預產期無產兆而入院，以 piton-S 引產，子宮頸口開 7 公分，胎兒監視器顯示有胎心音晚期減速的現象，下列處置何者正確？  
(A)減少液體攝入量與靜脈注射量，以避免胎心音更加緩慢  
(B)為胎兒臍帶受壓迫，可運用膝胸臥位協助改善臍帶受壓  
(C)協助採左側臥、給氧，減少或暫停 piton-S 的給予  
(D)是胎頭受壓時所呈現的正常反應，故不需特別處理
- 14 產時評估胎頭高度為 0，屬於下列何種情況？  
(A)胎頭仍浮動 (B)胎頭已固定 (C)胎頭在會陰口 (D)胎頭位置不確定
- 15 有關待產婦護理之敘述，下列何者正確？  
(A)鼓勵定時解尿，以利胎兒下降 (B)維持平躺，可促進血液循環  
(C)預防噁心嘔吐，應該要禁食 (D)灌腸是避免產時污染的必要護理措施
- 16 下列那項胎心率的週期性變化和子宮收縮無關？  
(A)早期減速 (B)晚期減速 (C)變異性減速 (D)變異性加速
- 17 王女士，G<sub>1</sub>P<sub>1</sub>，產後第 1 天與護理師分享自己昨夜生產的過程，主訴很累，不想哺餵母乳。依據魯賓對產後母親行為的研究，王女士的行為處於那個時期？  
(A)接受期 (B)緊執期 (C)放手期 (D)獨立期
- 18 李女士哺餵母乳時很焦急的詢問護理師：「我不知道寶寶吃奶的動作正不正確」，下列回答何者錯誤？  
(A)當嬰兒嘴巴張大，可看到下嘴唇外翻，即為正確含乳姿勢  
(B)含乳正確時，兩頰應該沒有凹陷的現象  
(C)含住乳頭，發出嘖嘖聲，表示正確含乳  
(D)若正確含乳，嘴巴會完全封閉成真空狀態
- 19 李女士，33 歲，G<sub>2</sub>P<sub>2</sub>，產後 3 個月，現純母乳哺餵，月經尚未回復，過去曾使用口服避孕藥，後來用保險套。有關護理師指導產後生育計畫，下列何者較不恰當？  
(A)可續用保險套 (B)可使用子宮內避孕器  
(C)可口服含雌性素 (estrogen) 避孕藥 (D)採用泌乳無月經法

- 20 有關剖腹產後的護理措施，下列何者正確？  
(A)採硬脊膜外麻醉者，須平躺 8 小時，避免腦脊髓液流失  
(B)為減輕傷口疼痛，應儘量臥床休息，避免傷口裂開  
(C)因施打麻醉藥物的關係，須延後哺餵母乳的時間  
(D)必要時可於腹部塗抹薄荷油，以促進腸蠕動，避免腹脹
- 21 有關產後會陰傷口疼痛執行溫水坐浴指導之敘述，下列何者不恰當？  
(A)可促進循環，消除腫脹  
(B)每天坐浴 2~4 次，每次 20 分鐘  
(C)在產後 24 小時內開始  
(D)若有痔瘡也可配合藥物使用
- 22 有關血栓性栓塞的敘述，下列何者錯誤？  
(A)以霍曼氏徵象 (Homan's sign) 評估靜脈血栓  
(B)陽性反應是足部屈曲時，脛骨後肌壓迫深部靜脈而引起疼痛  
(C)常見足踝足背處有凹陷性水腫且合併局部血管紅腫壓痛  
(D)鼓勵並協助下床活動是預防血栓的方法之一
- 23 黃女士，G<sub>1</sub>P<sub>1</sub>，產後第一天哺餵母乳，她告訴護理師：「我很擔心過兩天會有乳房脹痛的情形」，下列護理指導何者最適宜？  
(A)餵完奶後把餘奶擠出  
(B)提醒個案少喝水  
(C)每次餵奶前做乳房按摩與熱敷  
(D)依照嬰兒的需求哺餵母乳
- 24 有關母乳哺餵之敘述，下列何者錯誤？  
(A)乳腺炎時可以繼續餵患側，並不會造成嬰兒感染  
(B)乳頭扁平通常使乳頭伸展性不佳，無法順利分泌乳汁  
(C)乳汁的多少和乳房的大小沒有關係  
(D)不要限制哺乳時間及次數可改善乳汁不足的情形
- 25 有關足月新生兒泌尿道的特徵，下列何者錯誤？  
(A)腎小管對於水分再吸收能力不足  
(B)腎小管對於電解質排除能力不足  
(C)出生後第 1 天尿量為 25 ml/kg/day  
(D)新生兒腎絲球過濾率較成人為低
- 26 有關新生兒身體評估的敘述，下列何者錯誤？  
(A)外耳翼頂點低於眼外眥時，可能有染色體異常  
(B)鼻尖的小白點為粟粒疹，出生後 3~5 天即會消失  
(C)乳頭如有白色分泌物，是受母親雌性素影響之現象  
(D)歐特蘭妮操作法 (Ortolani's maneuver) 評估若聽見喀答聲，表示髖關節有脫臼情形
- 27 有關新生兒出生第 5 天臍帶尚未掉落的出院護理指導，下列何者正確？  
(A)臍帶出現分泌物，就表示是感染徵象  
(B)洗澡後可以 75%酒精消毒，由臍帶根部進行環狀擦拭  
(C)臍帶需用紗布覆蓋，不要讓臍帶暴露在空氣中  
(D)臍帶出現脫落徵象時，用手將其移除，再用 75%酒精消毒
- 28 以新貝拉德量表 (New Ballard Score) 執行新生兒的身體成熟度評估時，下列何項結果較不符合妊娠 39 週男嬰的生理特徵？  
(A)乳暈突起 3~4 mm  
(B)皮膚透明、可見靜脈  
(C)耳朵軟成形、可反彈  
(D)陰囊皺摺多，睪丸下降
- 29 有關懷孕期間貧血的原因與診斷之敘述，下列何者正確？  
(A)當孕婦血紅素低於 11 g/dl，血清中鐵蛋白濃度低於 12 µg/dl 時，即表示有缺鐵性貧血  
(B)海洋性貧血是屬於性染色體遺傳疾病，分為甲型及乙型二類  
(C)缺鐵性貧血是婦女第 11 對染色體短臂末端上的 2 個 β 血球基因 (β-globin gene) 突變所造成  
(D)若夫妻為同型海洋性貧血帶因者，其胎兒大多嚴重畸形，建議人工流產終止妊娠

- 30 謝女士，妊娠 23 週，過去無糖尿病病史，口服葡萄糖耐受試驗（OGTT）檢查發現 1 小時後血糖值 200 mg%，2 小時後為 180 mg%。有關謝女士的診斷，下列敘述何者正確？
- (A) 其兩次血糖數據均高過標準值，可確立為妊娠糖尿病  
(B) 其妊娠週數大於 20 週，故非妊娠引起的糖尿病，應屬於其他特定型糖尿病  
(C) 血糖值均超過 160 mg%，是屬於非胰島素依賴型糖尿病（type II diabetes）  
(D) 血糖值均超過 160 mg%，是屬於胰島素依賴型糖尿病（type I diabetes）
- 31 承上題，醫師安排謝女士需接受胰島素治療，她告訴護理師：「我上一胎生的小孩很健康，出生體重還 4,100 公克，我現在沒什麼不舒服，可不可以不要接受藥物治療？」，護理師的回應，下列何者較合宜？
- (A) 「您上一胎生了體重超過 4,000 公克的小孩，可能與妊娠糖尿病有關，此次應該要接受治療，因血糖不穩，小孩容易產生健康問題」  
(B) 「我會提醒醫師說您沒有不舒服，看看是否可以不要接受藥物治療，畢竟，任何藥物對胎兒都不太有利」  
(C) 「雖然您沒有不舒服，但您的血糖高於標準值，所以仍須接受治療，您只是口服降血糖藥物，對胎兒與您都沒有什麼影響」  
(D) 「通常妊娠糖尿病的症狀會在妊娠 25 週以後出現，不能以症狀來判斷糖尿病的嚴重度，建議您不要錯過治療時機」
- 32 有關妊娠糖尿病可能的合併症，下列何者錯誤？
- (A) 巨嬰 (B) 羊水過少 (C) 新生兒低血糖 (D) 妊娠誘發性高血壓
- 33 有關胎盤早期剝離婦女產後護理處置之敘述，下列何者正確？
- (A) 預防產後大出血及持續觀察凝血機制  
(B) 胎盤娩出後不可給予任何子宮收縮劑，以防血壓升高的副作用  
(C) 胎盤剝離處接近陰道，產生逆行性感染的機會高  
(D) 發生瀰漫性血管內凝血（DIC）症狀的高峰期為產後 1 星期
- 34 有關真空吸引協助胎兒娩出之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 適用胎頭骨盆不相對稱時 (B) 娩出後胎兒頭部可能會有血腫  
(C) 需要由有經驗的醫師執行 (D) 抽吸罩放置於胎頭的枕骨上
- 35 有關原發性痛經（primary dysmenorrhea）的敘述，下列何者正確？ ①下腹充血性疼痛 ②下腹痙攣性疼痛 ③發生於月經來潮前 1 週 ④發生於月經開始前數小時 ⑤經痛持續整個經期 ⑥經痛在月經來潮初期最明顯
- (A) ①③⑤ (B) ②④⑥ (C) ①④⑤ (D) ②③⑥
- 36 有關口服黃體素治療月經量過多的主要目的，下列何者正確？
- (A) 增加子宮收縮能力 (B) 抑制前列腺素的形成 (C) 維持卵巢濾泡期功能 (D) 抑制子宮內膜的形成
- 37 婦女服用混合雌性素與黃體素製劑改善更年期症狀，初期可能出現下列那些副作用？ ①體重增加 ②膚色變淡 ③乳房腫脹 ④月經出現 ⑤陰道分泌物減少
- (A) ①③④ (B) ①②⑤ (C) ②③④ (D) ③④⑤
- 38 下列何種病原感染與子宮頸癌之形成有關？
- (A) 大腸桿菌 (B) 金黃葡萄球菌 (C) 人類乳突病毒 (D) 淋病雙球菌
- 39 李女士，54 歲，平日排尿正常，主訴咳嗽或大笑時會有滲尿情況，因而不喜歡外出參加社交活動。李女士可能的問題為下列何者？
- (A) 壓力性尿失禁 (B) 滿溢性尿失禁 (C) 急迫性尿失禁 (D) 混合性尿失禁
- 40 承上題，下列護理指導何者最恰當？
- (A) 多食含膠質食物 (B) 白天減少喝水量 (C) 骨盆底肌肉運動 (D) 漸進式負重運動

- 41 仔仔，5 歲，在醫院中午用餐時，突然噎到東西，無法發聲且出現呼吸困難，此時護理師應該如何處理？  
(A)施壓劍突下部位 (B)進行人工呼吸 (C)以手掌扣擊背部 (D)給予心外按摩
- 42 大明，至溪邊玩，因溺水約 5 分鐘，送至急診室後，評估其中心體溫 33°C，知覺較遲鈍，有關回復體溫的處置，下列何者不適當？  
(A)提供溫熱的毯子 (B)提供熱湯並協助餵食 (C)給予加熱的潮濕氧氣 (D)給予電熱器加溫
- 43 兒童若長時期接觸玩具上不當的塗料或染料，最容易發生何種物質中毒？  
(A)鐵 (B)鋰 (C)鉛 (D)汞
- 44 小美，13 歲，因脊柱側彎住院接受手術及支架固定，住院已 2 週，下列護理措施何者較不合適？  
(A)為小美訂定一份生活作息表 (B)安排醫院課業輔導老師教導  
(C)鼓勵小美參與身體活動之安排 (D)鼓勵小美打電話邀請同學到醫院探視
- 45 小樺，18 個月，護理師為她做丹佛 II 嬰幼兒發展測驗 (DDST-II)，下列何者是她這個年齡幼兒應通過的項目？  
(A)會向前踢球 (B)自己走得很穩 (C)可以疊 6 塊積木 (D)會騎三輪車一陣子
- 46 有關 5 歲幼兒的生理功能，下列何者尚未達到成人的發展程度？  
(A)腎絲球的過濾率 (B)骨骼系統的發育 (C)聽覺與嗅覺功能 (D)唾液腺的分泌功能
- 47 有關嬰幼兒氣質評估之敘述，下列何者錯誤？  
(A)氣質評估可協助家長建立親子關係 (B)嬰幼兒的氣質型態可作為因材施教的依據  
(C)氣質評估可以預估兒童未來的智力發展 (D)氣質是嬰幼兒先天對內外刺激的反應方式
- 48 有關出生的過渡期，下列何者不是胎兒動脈導管的發展變化？  
(A)出生後，肺動脈壓上升導致動脈導管收縮而關閉  
(B)出生後約 2~4 天，產生功能上的關閉  
(C)出生後約 1~3 個月，產生解剖上的關閉  
(D)出生 3 個月後，動脈導管萎縮變成動脈韌帶
- 49 下列何者是血友病病童關節血腫較少出現的部位？  
(A)膝關節 (B)踝關節 (C)肘關節 (D)肩關節
- 50 黃小妹，出生 48 小時即全身黃疸，膽紅素值 12 mg/dl，檢驗結果顯示為血型不合造成之溶血性黃疸，有關這種病理性黃疸的原因，下列敘述何者正確？  
(A)母親的血型是 A 型，胎兒的血型是 O 型  
(B)母親的血型是 O 型，胎兒的血型是 A 或 B 型  
(C)母親的血型是 AB 型，胎兒的血型是 O 型  
(D)母親為 Rh(+)，胎兒為 Rh(-)
- 51 婷婷，14 歲，罹患急性白血病，經過多次化療，現再度復發，有關青少年對死亡的理解及反應，下列敘述何者錯誤？  
(A)對死亡的概念有成熟的理解，但仍有許多的疑問  
(B)較易認為自己不會在這麼年輕的時候就死亡  
(C)較易與醫護人員表達自己對死亡的看法  
(D)較不能與父母溝通以取得父母的支持
- 52 榕榕，10 歲，為罹患罕見疾病病童的姊姊，為協助其適應病童的疾病及治療的變化，下列護理措施何者最為適當？  
(A)因榕榕對疾病知識或治療缺乏興趣，故無須主動介入  
(B)安撫榕榕，鼓勵其隨時提問或參與病童的照護活動  
(C)建議榕榕少到醫院探望病童，因為會增加病童的困擾  
(D)說服榕榕學習自我照顧，因為爸媽需要全力照顧病童

- 53 許小妹妊娠週數 26 週 3 天，為早產，執行身體檢查與評估時，下列何者為最可能出現的臨床表徵？  
(A)胎毛少，足底皺摺多，皮下脂肪多 (B)手肘難以越過對側鎖骨中線 (scarf sign)  
(C)腳跟難以觸及耳朵 (heel to ear) (D)四肢肌肉張力無力，難以維持屈曲姿勢
- 54 小強，於 15 個月大時被診斷有輕微的腦性麻痺 (cerebral palsy)，於指導雙親對小強在 24 個月大時之預期性發展任務，下列何者不適當？  
(A)促進自理能力的掌控 (B)建立正向的身體心像  
(C)增強對痛覺反應的能力 (D)提供活動所需之額外熱量
- 55 有關協助兒童因應親人死亡的哀傷照護方式，下列何者不適當？  
(A)運用適合兒童發展階段能理解的語言，說明親人的死亡  
(B)告訴兒童難過是可以理解的，鼓勵兒童以他們的方式表達感覺  
(C)儘量少與兒童談及死亡的親人，以免造成無法處理的悲慟  
(D)接受兒童在其親人過世後可能有的退化性行為
- 56 有關兒童罹患麻疹之臨床表徵，下列護理評估何者錯誤？  
(A)前驅期時兒童會有咳嗽、結膜炎及鼻炎等症狀，此時體溫通常維持正常範圍  
(B)病童的下顎黏膜會發現中心藍白色而周圍呈不規則紅斑之科氏斑點 (Koplik spots)  
(C)科氏斑點出現後 1~2 天，在兒童發燒到最高峰時便開始出疹  
(D)發疹的順序為：由上而下，前額、臉部、頸部、上肢、軀幹和下肢
- 57 下列何種疫苗的接種途徑是肌肉注射，注射部位在嬰幼兒的大腿前外側？  
(A)卡介苗 (B)日本腦炎疫苗  
(C) B 型肝炎免疫球蛋白 (D)麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗
- 58 小明，3 歲，連續多日出現高燒 (40~40.6°C)、食慾不振、口腔黏膜多發性潰瘍、牙齦紅腫出血、前頸部淋巴結腫痛、口腔外出現疱疹。醫師診斷為疱疹性口齦炎 (Herpetic Gingivostomatitis)。下列護理措施何者不適當？  
(A)協助使用含類固醇的口內膏來減輕炎症反應 (B)衛教父母以流質及冰涼的食物來餵食  
(C)協助口服 acyclovir 來減輕疼痛及改善症狀 (D)衛教父母目前尚無疫苗可預防此病毒感染
- 59 有關小型噴霧治療 (micro-nebulizer therapy) 之護理措施，下列敘述何者錯誤？  
(A)將藥物及生理食鹽水混合置入噴霧器之藥杯，氧氣流量需調整至 6~8 L/min  
(B)使用時需將噴霧器呈垂直狀，以使氣動將藥物轉換成 2~5 $\mu$ m 的噴霧粒子  
(C)若病人為嬰兒，可將小型噴霧器架於氧氣頭罩上以增加效果  
(D)限每位病童個人單獨使用，藥杯與噴霧器每天清洗一次
- 60 小英，7 歲，診斷為氣喘，居家長期監測尖峰呼氣流量 (peak expiratory flow rate, PEFR)，其自我監測的個人最佳值為 220 L/min。某日清晨，小英的 PEFR 為 130 L/min，到傍晚上升為 170 L/min，護理師判斷小英目前所處的狀態為何？  
(A)呼吸道症狀已有改善，持續維持正常生活作息  
(B)呼吸道症狀逐漸被控制，預期 PEFR 將會更改善  
(C)呼吸道有發炎及黏膜水腫，小心監測 PEFR 的變化  
(D)呼吸道出現急性發作的危險，必須立刻緊急就醫治療
- 61 下列敘述何者符合兒童呼吸系統的解剖生理特徵？  
(A)鼻腔狹小、鼻黏膜柔軟且微血管豐富 (B)耳咽管 (歐式管) 較成人短、窄且水平  
(C)喉頭較窄、較高；約在第 4~5 頸椎部位 (D)肺泡表面積相對多，使得呼吸換氣量較多

- 62 王小妹，足月出生，被診斷罹患開放性動脈導管，為其進行護理評估，下列何項臨床表徵較不會出現？  
(A) 餵食時，容易出現發紺的缺氧發作  
(B) 觀察呼吸情況，可能發現肺部水腫症狀  
(C) 觸診上肢脈搏時，常會出現寬廣的脈搏壓  
(D) 聽診時，胸骨左側第二肋間有連續的機械性心雜音
- 63 法洛氏四重畸形常見的臨床表徵是發紺，下列敘述何者錯誤？  
(A) 是血液中含氧量過低的結果  
(B) 急性缺氧發作常發生在早晨、餵奶、哭泣或排便時  
(C) 主要是血液有由左至右的分流  
(D) 主要是肺動脈狹窄所致
- 64 有關再生不良性貧血病童的臨床症狀與實驗室檢查，下列敘述何者錯誤？  
(A) 血容積小於 30% 時，會有心跳加快、呼吸急促的現象  
(B) 嗜中性白血球數少於  $1,500/\text{mm}^3$  時，會容易發生細菌感染現象  
(C) 血小板數小於  $50,000/\text{mm}^3$  時，易出現瘀斑及出血現象  
(D) 胎兒紅血球降低時，易出現進行性的溶血性貧血
- 65 協助罹患細小支氣管炎之病童執行姿位引流，下列時間何者較不適當？  
(A) 飯後半小時                      (B) 睡覺前                      (C) 早晨睡醒時                      (D) 飯前 1 小時
- 66 琪琪，女嬰，新生兒篩檢診斷為葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶缺乏症 (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency, G-6-PD Deficiency)，下列有關此代謝疾病之敘述，何者錯誤？  
(A) 此疾病主要由父親傳給小孩，以女嬰居多                      (B) 易發生溶血性貧血及高膽紅素血症  
(C) 嬰兒發燒時應避免使用 Aspirin                      (D) 母親哺乳期間應避免食用蠶豆
- 67 有關癌症病童疼痛時止痛劑的使用原則，下列敘述何者錯誤？  
(A) 定時給予止痛劑，以維持無痛狀態                      (B) 給藥途徑以口服優先選用  
(C) 重度疼痛需選擇嗎啡類的止痛劑                      (D) 不可併用不同類的止痛劑
- 68 有關癌症病童接受化學治療期間的感染預防措施，下列敘述何者錯誤？  
(A) 避免接種活性的病毒疫苗                      (B) 避免接觸水痘或麻疹病童  
(C) 縮短住院時間以防院內感染                      (D) 進食的食物需經微波處理
- 69 小容，17 歲，診斷為甲狀腺機能亢進 (Hyperthyroidism)，下列臨床表徵何者錯誤？  
(A) 腸蠕動增快，易腹瀉                      (B) 食慾增加，但體重減輕  
(C) 皮膚乾燥、頭髮易斷裂                      (D) 注意力不集中、情緒不穩
- 70 急性淋巴性白血病童在接受化學治療多久後，會出現血球低下問題？  
(A) 24~72 小時                      (B) 7~14 天                      (C) 4~6 週                      (D) 2~3 個月
- 71 小明，妊娠週數 32 週出生，體重 1,500 gm，將進行口胃管餵食，下列護理措施何者正確？  
(A) 測量插入的長度宜由鼻尖經耳垂，連接至劍突和肚臍中點的距離  
(B) 插入過程若無咳嗽、噎到、發紺，表示未插到氣管，可安全地灌食  
(C) 灌食速度要緩慢，約 5 mL/5~10 分鐘，以預防胃部過度膨脹  
(D) 餵食後協助左側臥、頭抬高 45 度約 30 分鐘，以防吸入性肺炎

- 72 小美，12 個月，診斷為泌尿道感染（urinary tract infection, UTI），有關出院護理指導，下列敘述何者錯誤？
- (A) 為避免因包尿布引起感染，立即開始大小便訓練
  - (B) 避免泡澡，儘量採淋浴的方式清潔身體
  - (C) 大小便後，會陰部的清潔需由前往後擦拭
  - (D) 可多攝取蔓越莓汁，以減少重複感染機會
- 73 有關隱睪症的評估，下列敘述何者錯誤？
- (A) 保持檢查環境溫暖，避免提睪肌收縮會將睪丸拉回至腹股溝內
  - (B) 視診，睪丸未下降側的陰囊縮小，且表皮平滑、缺少摺紋
  - (C) 6 個月大前，可讓嬰兒平躺，以觸診檢查雙側的陰囊
  - (D) 大於 6 個月的小孩宜採站姿檢查，以緩和提睪肌
- 74 有關尿道下裂病童手術後的護理措施，下列敘述何者不適當？
- (A) 限制喝水，以降低尿液滲漏
  - (B) 導尿管固定於腹部或腿上，以免牽扯傷口
  - (C) 避免淋浴，直到傷口痊癒為止
  - (D) 預防便秘，以免影響傷口癒合
- 75 王小妹，10 歲，診斷為急性腎絲球腎炎，每天尿量約 250 c.c.，血中尿素氮（BUN）100 mg/dL，下列護理指導何者錯誤？
- (A) 攝取生酮飲食，以利腎絲球過濾
  - (B) 攝取低蛋白質飲食，以保護腎臟功能
  - (C) 嚴格限水，以控制水腫與高血壓
  - (D) 避免高鉀食物，以減少水分滯留
- 76 小嫻，4 歲，預行排尿性膀胱尿道攝影（VCUG），有關檢查前後的護理措施，下列何者正確？
- (A) 檢查前，至少禁食（NPO）8 小時，以免引起嘔吐
  - (B) 檢查前，需給予清潔灌腸，以免影響影像判讀
  - (C) 檢查中，需收集尿液，測量膀胱壓力，以了解排尿功能
  - (D) 檢查後，需鼓勵多喝水，以利排出顯影劑
- 77 王小弟，9 歲，診斷為裘馨氏假肥大性肌失養症（Duchenne's pseudohypertrophic muscular dystrophy），下列護理指導何者不適當？
- (A) 鼓勵王小弟進行體能活動，避免肢體攣縮變形
  - (B) 避免讓王小弟游泳，以防溺水意外之發生
  - (C) 家中添加輔助性設施，以減少王小弟發生意外
  - (D) 每日為王小弟執行胸腔物理治療，以預防肺炎
- 78 張小弟，就讀小學三年級，罹患強直陣攣型癲癇（tonic-clonic seizure），有關其在學校癲癇發作時的照護，下列敘述何者錯誤？
- (A) 協助採取側臥姿勢，以利口鼻分泌物流出
  - (B) 疏散圍觀人潮維持通風，以免影響呼吸
  - (C) 移除身旁堅硬及尖銳物，以提供安全環境
  - (D) 立即進行口對口人工呼吸，以避免缺氧
- 79 曉華，5 歲，診斷為重症肌無力（myasthenia gravis），下列護理指導何者錯誤？
- (A) 應教導家長注意曉華的呼吸是否順暢、痰液不易咳出
  - (B) 應鼓勵曉華多進食需咀嚼的食物，以減緩咀嚼功能之退化
  - (C) 應減少曉華費力的活動，以改善肌肉力量、保留體力
  - (D) 若仍有眼瞼下垂、視力不佳情形，應注意其活動安全
- 80 小華，14 歲，疑似腦膜炎，目前有咳嗽、顱內壓升高的症狀，有關小華的照護措施，下列敘述何者正確？
- (A) 維持屈膝仰臥，以利靜脈血回流
  - (B) 給予背部叩擊，以促進痰液排出
  - (C) 教導深呼吸咳嗽，避免引發肺炎
  - (D) 攝取高纖維食物，以避免便秘