

等 別：高等考試  
類 科：護理師  
科 目：產兒科護理學  
考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

(二)本科目共50題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 有關我國目前優生保健法中的人工流產之相關規定與法則，下列敘述何者正確？
  - 有配偶之婦女若因懷孕或生產將影響其心理健康，而自願實施人工流產者，不須告知配偶，即可實施人工流產
  - 若符合法令規定之適用對象且無身體異常情形，可以使用 Mifepristone-RU486 施行人工流產
  - 16 歲以上之未婚婦女依相關規定實施人工流產，不須經過法定代理人同意即可實施
  - 因配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳疾病者，而自願實施人工流產者，須告知配偶，方可實施人工流產
- 李女士 24 歲，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，現懷孕 32 週，產檢皆正常。主訴頻尿但無灼熱感，睡覺平躺時很容易頭暈、心悸。詢問護理師原因，下列回應何者最恰當？
  - 懷孕頻尿和頭暈很正常，小心一點就可以了
  - 頻尿是目前常見的症狀，不要憋尿；睡覺頭暈、心悸可能跟姿勢有關，試試側睡
  - 頻尿是泌尿道感染，要注意會陰部清潔；頭暈、心悸可能是貧血，多吃深綠色蔬菜
  - 頻尿是泌尿道感染，頭暈是貧血，等會告訴醫師檢查一下
- 林女士，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，懷孕 14 週，今天產檢時的主訴如下，下列那一項較不符合目前的生理變化？
  - 最近常覺得有心悸
  - 感覺寶寶在睡前活動較多
  - 噁心嘔吐感好像比較少了
  - 懷孕前的褲子扣子都扣不上了
- 王女士，懷孕 16 週，有關產檢報告結果，下列何者需最優先給予衛教？
  - 尿糖陰性
  - 尿蛋白微量
  - 德國麻疹 IgG 陰性
  - B 型肝炎 HBsAg 陰性
- 阮氏女士，懷孕 32 週，有關胎動監測之護理指導，下列何者不適當？
  - 每天同一時間測量，兩小時內至少有 10 次胎動
  - 胎動比昨天的次數少一半是不正常
  - 飯前或空腹時比較容易有明顯胎動
  - 觀察時雙手可以放在腹部觸摸感受
- 第三孕期婦女抱怨下肢腫脹，傍晚時鞋子就穿不下，下列護理指導何者不適當？
  - 可穿舒適軟質包鞋
  - 穿著及膝彈性襪
  - 可做足背屈曲運動
  - 臥床休息時，採左側臥
- 王女士，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，妊娠 39 週，因規則陣痛入院待產，護理紀錄上寫著「Effacement：50%」，其代表的意思為何？
  - 子宮頸變薄程度達 50%
  - 胎心音變異性達 50%
  - 胎頭下降進入骨盆腔 50%
  - 胎兒內轉已完成 50%
- 潘女士，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，懷孕 41 週，因規則陣痛而入院待產，胎位為左枕前位（LOA），未接受硬脊膜外麻醉。現因宮縮強且密集，陰道內診發現子宮頸已擴張完全，胎兒高度+2。在此情境下，下列敘述何者不適當？
  - 臉部顯得潮紅，陰道口看到的現血量增加
  - 宮縮時，出現不自主向下用力的動作
  - 胎心音在母體左邊肋骨前上棘與肚臍連線的中點附近最清楚
  - 胎心率在宮縮開始時變慢，在宮縮高峰時達到最低點，宮縮結束又恢復正常
- 第二產程中所應用的呼吸型式中，能減少因胎兒娩出時所致會陰或產道撕裂傷，下列何項最不適當？
  - 吹蠟燭呼吸法
  - 屏氣 10 秒向下用力
  - 開聲門用力
  - 緩慢哈氣呼吸
- 徐女士 30 歲，G<sub>2</sub>P<sub>1</sub>，懷孕 35 週。因在家感覺子宮規則收縮疼痛，故入院。檢查發現每隔 10 分鐘宮縮一次，持續 30 秒，強度 40 mmHg，內診子宮頸口開 4 公分，70%變薄，胎位為臀位，主訴有很多水從陰道流出。護理師最優先的照護措施為下列何者？
  - 立刻通知超音波室
  - 給予靜脈輸液
  - 監測胎兒心跳速率
  - 準備進行催生
- 有關治療子宮內膜異位症的藥物，下列何者錯誤？
  - 排卵藥
  - 含黃體素的口服避孕藥
  - 雄性素衍生荷爾蒙，如：Danazol
  - 促性腺激素釋放荷爾蒙類似物（GnRH Analogs）

- 12 有關產後憂鬱症 (postpartum depression) 的敘述, 下列何者錯誤?  
(A) 持續支持並協助順利哺餵母乳有利於改善症狀 (B) 症狀常在產後 4 週出現, 且症狀持續超過 2 週  
(C) 可能與面臨經濟壓力與家事照顧問題有關 (D) 可能與產後動情素、黃體素濃度突然上升有關
- 13 有關哺乳期各種避孕法, 下列敘述何者錯誤?  
(A) 非荷爾蒙作用之避孕措施, 不會影響泌乳, 可以安全使用  
(B) 單一雌性素的荷爾蒙避孕藥不會影響乳汁分泌, 適合選用  
(C) 雌性素及黃體素之混合型避孕藥, 可能減少奶量, 不建議使用  
(D) 如果不再有生育的計畫, 輸精管結紮是永久避孕的首選
- 14 吳女士陰道生產, 產後第 3 天表示:「坐著哺乳我的腰很痠」, 下列何種產後運動最適合教導?  
(A) 凱格爾氏運動 (Kegel's exercise) (B) 骨盆搖擺運動  
(C) 下肢抬腿運動 (D) 仰臥起坐
- 15 王女士, 初產婦, 陰道生產, 採純母乳哺育, 產後 6 週重返職場的一週後, 因發燒乳房紅腫熱痛求診, 診斷為乳腺炎。下列的護理措施何者不適當?  
(A) 改善發紅部位的乳房引流  
(B) 進行完整的哺乳史評估, 並去除可能的導因  
(C) 給予症狀照護, 包括: 餵奶前服用止痛藥, 或餵奶後冰敷止痛  
(D) 立即協助乳汁培養並立即進行完整抗生素治療
- 16 有關胎盤早期剝離之敘述, 下列何者錯誤?  
(A) 需要密切觀察胎心音 (B) 易呈現高張力宮縮  
(C) 可能合併症為瀰漫性血管內凝血 (DIC) (D) 為無痛性的陰道出血
- 17 護理人員使用新貝拉 (New Ballard Score) 量表, 進行四位出生第 3 小時的新生兒成熟度評估, 下列那位新生兒可能為早產兒?  
(A) 王小弟, 方形窗徵象角度為  $0^{\circ}$ , 手臂反彈角度為  $60^{\circ}$   
(B) 林小妹, 膝關節角度為  $140^{\circ}$ , 全身胎毛豐富  
(C) 黃小弟, 圍巾徵象手肘不能越過同側乳房中線, 乳暈突起且直徑 5 mm  
(D) 洪小妹, 足底前 2/3 有皺褶, 皮膚乾燥看不見血管
- 18 有關新生兒篩檢的敘述, 下列何者正確?  
(A) 採血時間為新生兒出生後滿 12 小時  
(B) 穿刺部位應選擇足跟的外面兩側  
(C) 血量不足時, 應用力擠壓穿刺部位以利血液流出  
(D) 為減少新生兒的疼痛, 應使用注射針頭進行採檢
- 19 下列何項護理措施較無法改善新生兒溢奶的狀況?  
(A) 餵食採漸進式奶量增加 (B) 餵食後協助排氣  
(C) 餵食後採左側臥 (D) 避免過度餵食
- 20 下列何種情況易導致待產婦女發生子宮內翻 (Uterine Inversion)? ① 娩出胎盤時過度牽引臍帶 ② 過早注射 Methergin ③ 在子宮底施加壓力 (fundal pressure) ④ 胎盤早期剝離  
(A) ①② (B) ①③ (C) ③④ (D) ②④
- 21 林女士, 入院待產, 醫師內診時發現臍帶脫垂, 下列處置何者錯誤?  
(A) 將脫出的臍帶再推回子宮內 (B) 使用無菌生理食鹽水紗布覆蓋  
(C) 若子宮頸尚未完全擴張, 緊急剖腹生產 (D) 戴無菌手套從陰道將先露部位往上頂
- 22 待產婦女於生產過程中發生肩難產 (shoulder dystocia) 時, 下列處置何者為宜? ① 教導待產婦快速屈曲大腿靠向腹部 ② 於子宮底施壓 ③ 加強子宮收縮藥劑量 ④ 注意胎心音變化  
(A) ①③ (B) ②③ (C) ②④ (D) ①④
- 23 重度子癩前症孕婦之飲食指導, 下列建議何者最適當?  
(A) 高蛋白質低鈉飲食 (B) 低蛋白質低鈉飲食 (C) 低蛋白質高鈉飲食 (D) 高蛋白質高鈉飲食
- 24 護理師從胎兒監測器得知, 胎兒心跳 100 次/分, 持續 80 秒, 其型態與宮縮沒有一定關係, 此胎心率型態為:  
(A) 胎心率正常 (B) 變異性減速 (C) 早發性減速 (D) 晚發性減速

- 25 毛女士接受人工受精治療後懷孕併多胞胎妊娠，將接受減胎術，毛女士表示很擔心嬰靈會對自己有不好的影響，下列護理師之回應何者最適當？  
(A) 嬰靈說法無科學根據，減胎是不得不的決定  
(B) 衛教多胞胎的早產風險，告訴毛女士她是以大局為重  
(C) 詢問毛女士的宗教信仰，鼓勵毛女士說出對嬰靈的看法  
(D) 請毛女士不要胡思亂想，為了腹中胎兒她要往前看
- 26 合併唇裂 (cleft lip) 與腭裂 (cleft palate) 嬰幼兒之手術前護理措施，下列敘述何者最適當？  
(A) 餵食時，使用孔洞小的奶嘴，避免吞食過多空氣  
(B) 以鼻胃管餵食，避免使用口腔唇舌肌肉，擴大唇裂與腭裂之裂縫  
(C) 餵食時，採平躺姿勢，利於吞嚥，避免奶水溢出  
(D) 餵食時，餵食器放於口腔內後方或臉頰內側面，避免奶水進鼻腔內
- 27 關於自閉症兒童的敘述，下列何者錯誤？  
(A) 出現孤立的人際互動，缺乏目光接觸  
(B) 對環境改變很敏感，須儘量維持一致性  
(C) 難以接受改變的僵化思考模式  
(D) 用 luminal 治療疾病，須服用 6~8 週後效果佳
- 28 有關成骨不全 (osteogenesis imperfecta) 的相關敘述，下列何者錯誤？  
(A) 藍色鞏膜為典型症狀之一  
(B) 可能會喪失聽力  
(C) 需要限制任何活動  
(D) 四肢極短且彎曲呈弓形、肌肉張力減退
- 29 小華會把樂高分享給小美，兩人會交換玩具，但各玩各的，是屬於兒童遊戲發展那一個階段？  
(A) 合作遊戲  
(B) 聯合遊戲  
(C) 平行遊戲  
(D) 旁觀遊戲
- 30 關於 9 歲學齡期兒童的發展及生長，下列敘述何者最適當？  
(A) 喜歡模仿成人行為  
(B) 有質量保留的概念  
(C) 可以做抽象思考  
(D) 對男女生殖器感到好奇
- 31 一瓶 nystatin 懸浮液為 100,000 units/mL，兒童罹患鵝口瘡需要一天四次服用，每次給予 250,000 units，請問應給予幾 mL？  
(A) 1.5  
(B) 2.0  
(C) 2.5  
(D) 3.0
- 32 3 歲的小杰生病住進了加護病房第 4 天，小杰顯得安靜、沉默以及對病房的事物不感興趣，其分離焦慮是處於那個時期？  
(A) 抗議期 (protest)  
(B) 失望期 (despair)  
(C) 去依戀期 (detachment)  
(D) 過渡期 (transition)
- 33 有關壞死性結腸炎 (necrotizing enterocolitis) 的敘述，下列何者正確？  
(A) 腸黏膜壞死後，以革蘭氏陽性菌最常侵犯腸壁  
(B) 常侵犯部位是在幽門附近及小腸近端處  
(C) 引起的原因是腸黏膜缺血缺氧  
(D) 優先採取的處置是以鼻胃管餵食半奶的嬰兒配方奶
- 34 楊小妹，妊娠週數 31 週，出生體重 1,628 公克，有關楊小妹出生後的生理特徵，下列敘述何者錯誤？  
(A) 腎小管再吸收功能差，會出現蛋白尿及尿糖  
(B) 凝血因子不足與維生素 K 低下，易出現凝血功能不良  
(C) 乳糖消化能力尚未成熟，會有暫時性乳糖吸收不良症  
(D) 肺泡表面張力素分泌不足，容易出現持續性肺動脈高壓
- 35 7 歲的小雄，面對爺爺過世，小雄一直吵著媽媽說爺爺在睡覺，要去找爺爺說話。有關和小雄談論死亡的敘述，下列何者不適當？  
(A) 鼓勵小雄說出心裡的話和問題  
(B) 正確的向小雄描述死亡的狀態和事實  
(C) 避免讓小雄參加喪禮  
(D) 利用日常經驗或影片認識死亡
- 36 有關新生兒胎便吸入症候群的症狀及處置之敘述，下列何者錯誤？  
(A) 皮膚、指甲，或臍帶有胎便沾染痕跡  
(B) 可能發生呼吸窘迫的症狀  
(C) 羊水有胎便，嬰兒娩出後，立即以甦醒球 (ambu bag) 加壓刺激呼吸  
(D) 動脈血液氣體分析顯示呼吸衰竭，需矯正呼吸性酸中毒
- 37 有關嬰兒玫瑰疹 (roseola) 的評估，下列敘述何者錯誤？  
(A) 會出現突然的高燒且持續 3~5 天左右  
(B) 枕下/耳後的淋巴結可能有腫大的情形  
(C) 軀幹先出現散發性的玫瑰紅斑點  
(D) 發疹期間大約會持續 1 週以上才消退
- 38 有關病童接受氧氣治療的照護措施，下列敘述何者最適當？  
(A) 以氧氣濃度分析儀上的感應器測量氧氣濃度時，病童的口鼻處為最佳部位  
(B) 使用氧氣頭罩時，氧氣流速最好小於 3 L/min，避免二氧化碳滯留  
(C) 鼻套管管徑較小，氧氣流速宜在 10 L/min 以上，以免氧氣濃度不足  
(D) 使用氧氣帳的目的包括讓病童與他人隔離以避免傳染

- 39 10 歲的連小妹持續乾咳多日，有輕微發燒，胸部 X 光檢查發現兩側下肺葉呈現間質性浸潤，痰中的單核白血球上升，且家中的雙胞胎妹妹也曾有類似的症狀，下列何者為連小妹罹患肺炎最可能的致病因子？  
(A)金黃色葡萄球菌 (B)肺炎鏈球菌 (C)黴漿菌 (D) b 型嗜血桿菌
- 40 2 歲的王小弟罹患先天性心臟病，以毛地黃 (digoxin) 治療，一天服用兩次。下列敘述何者正確？  
(A)餐後半小時內服用藥物 (B)可與牛奶或果汁一起服用  
(C)若忘了服用藥物，六小時內可以補給原劑量 (D)給藥後需測量心尖脈
- 41 6 歲的小強因不明原因的貧血而入院，欲進行骨髓抽吸術 (bone marrow aspiration)，下列處置及護理措施何者錯誤？  
(A)此年紀穿刺部位以近側脛骨優先  
(B)穿刺後傷口應以紗布覆蓋加壓至少 15 分鐘以防出血  
(C)術前評估小強是否有出血異常或服用凝血相關藥物  
(D)穿刺後 1 小時內需密切監測生命徵象及傷口出血情形
- 42 有關預防腫瘤溶解症候群 (tumor lysis syndrome) 所進行的相關處置，下列敘述何者錯誤？  
(A)持續監測尿糖 (B)化學治療前大量給水  
(C)依醫囑按時服用 allopurinol (D)靜脈輸液加入碳酸氫鈉
- 43 3 歲的小萱出現發燒、臉色蒼白、腹痛，經醫師確診為神經母細胞瘤第三期，有關提供父母的護理指導，下列敘述何者不適當？  
(A)神經母細胞瘤出現的症狀與壓迫部位有關  
(B)因腫瘤已超過身體中線，手術已無法完全切除  
(C)需抽血監測兒茶酚胺 (catecholamine) 以確認是否轉移  
(D)骨髓檢查是要確認小萱骨髓是否受到侵犯
- 44 有關甲狀腺功能亢進 (hyperthyroidism) 的照護措施，下列敘述何者最不適當？  
(A)配合病童代謝率增加的需求，可準備高熱量飲食  
(B)不可隨便停藥，以防病童產生甲狀腺危象  
(C)觀察病童體溫過低的症狀和徵象  
(D)病童注意力不集中，宜安排在安靜環境中學習
- 45 有關乳糜或粥樣瀉 (celiac disease) 的敘述，下列何者正確？  
(A)是自體免疫疾病，對麩質無法耐受所造成的腸病變  
(B)飲食治療以穀類與麥類為主，並適時補充維生素 C  
(C)無腹痛，但解血絲便  
(D)使用廣效型抗生素以減輕腸道發炎情形
- 46 有關排尿性膀胱尿道攝影 (voiding cystoureterography, VCUG) 的敘述，下列何者最適當？  
(A)檢查目的為評估病童尿液逆流的嚴重程度  
(B)檢查前應進行小量灌腸以幫助影像判讀  
(C)檢查前鼓勵病童多喝水，有助於攝影的進行  
(D)檢查過程無使用顯影劑，檢查後讓病童自然排尿即可
- 47 有關人工肛門造瘻口之術後護理指導，下列何者較適當？  
(A)當造瘻口流出大量水樣引流物時，表示功能正常  
(B)術後三週內採低渣飲食，減少腸蠕動  
(C)術後造瘻口一般外觀應呈深黑色且表面乾燥  
(D)乙狀結腸造口糞便多呈液狀
- 48 7 歲的奇奇罹患腦性麻痺，因基底核和錐體外病變，產生不自主運動，且出現無法控制四肢抖動，尤其影響手部的書寫功能，有關奇奇罹患之腦性麻痺的型態，下列何者正確？  
(A)痙攣型 (spastic) (B)運動失調型 (ataxic)  
(C)手足徐動型 (athetoid type) (D)無張力型 (atonic)
- 49 10 歲的曉華罹患頑固型癲癇，醫生建議以生酮飲食治療，下列何者正確？  
(A)高蛋白質、低醣類 (B)高脂肪、低醣類 (C)高醣類、高蛋白質 (D)高纖維質、低脂肪
- 50 有關單側性發展性髖關節發育不良 (developmental hip dysplasia, DDH) 病童的臨床表徵，下列何者錯誤？  
(A)病童的臀部及大腿皮膚皺褶左右不對稱  
(B)患肢單腿站立時，健肢髖部的高度會向下傾斜  
(C)仰臥，將髖部曲折成 90 度時，健肢膝部會降低  
(D)患肢腿屈曲做外展運動時，會出現卡嗒 (click) 聲