

97 年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員（不含牙醫師、助產師、職能治療師）、中醫師、心理師、營養師、獸醫佐考試暨醫師考試分試考試、97 年專門職業及技術人員高等考試法醫師考試試題

代號：4110
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：產兒科護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)本試題禁止使用電子計算器。

- 下列何者不是行政院衛生署制定的哺乳十大政策之一？
(A)成立母乳哺育諮詢專線 (B)實施母嬰同室
(C)鼓勵準爸爸陪產 (D)鼓勵純餵母乳
- 穹窿（Fornix）指的是下列何項部位？
(A)子宮頸內口深入子宮中而形成的窩狀部位
(B)子宮頸深入陰道中而形成的窩狀部位
(C)陰道後壁與子宮直腸窩之間部位
(D)陰道前壁與膀胱相接之部位
- 滋養葉胞層（Cytotrophoblast）能分泌何種荷爾蒙，為目前驗孕試驗檢測之物質？
(A)黃體素 (B)雌性素 (C)人類絨毛膜性腺激素 (D)人類胎盤泌乳激素
- 陳女士 34 歲，第一胎，目前懷孕 22 週。她在產檢時告訴護理人員說：「自從懷孕後變得好醜，再來還有十幾週，真不想再懷孕下去了。」對於她的敘述，何項回應較合適？
(A)「這可能和你懷的孩子性別有關係。」
(B)「這些是懷孕的關係，不要太在意外表的美醜。」
(C)「身體外觀的變化讓你感到不舒服，是嗎？」
(D)「妳試過用化妝來改善嗎？」
- 某孕婦向護理人員表示：她的最後 1 次月經（LMP）的第 1 天為 96 年 8 月 26 日，根據 NaGele's rule，她的預產期為：
(A) 97 年 6 月 2 日 (B) 97 年 6 月 1 日 (C) 97 年 5 月 31 日 (D) 97 年 5 月 30 日
- 林太太懷孕 31 週，向護理人員說：「我小孩胎動的時候，手會突出來，所以肚子會鼓出一塊，我就會和他握握手，他就會把手縮回去了。」此時護理人員的回應以下列何者最合適？
(A)「妳可以在家自己測胎動，如果有減少的現象就必須回醫院檢查。」
(B)「怎麼可能？妳未免太誇大了吧！」
(C)「這種感覺一定很棒！」
(D)「妳可能需要到精神科看診。」
- 妊娠末期孕婦之心輸出量，於側躺與正躺時之比較結果為下列何者？
(A)側躺時比正躺減低約 10% (B)側躺時比正躺高出約 20%
(C)側躺時比正躺減低約 30% (D)側躺時比正躺高出約 35%
- 莊太太已懷孕 30 週，她抱怨飯後常有胃酸逆流，心口附近很不舒服，下列何項措施較合適？
(A)多攝取高纖維食物 (B)多服用重碳酸鈉來改善症狀
(C)建議少量多餐，避免進食過量 (D)飯後可平躺半小時後才活動
- 妊娠末期之腹輕感（Lightening），主要原因來自下列何者的變化？
(A)子宮的重量 (B)子宮底高度 (C)子宮的收縮 (D)荷爾蒙
- 針對缺鐵性貧血的孕婦給與鐵質補充的指導，下列何者錯誤？
(A)鐵劑的副作用可能有腹瀉 (B)鐵劑宜飯前服用
(C)多攝取深綠色葉菜類 (D)液狀鐵劑須以吸服用
- 為預防待產婦分娩異常，下列措施何項不適當？
(A)預防體液電解質喪失 (B)於分娩早期禁止含高碳水化合物之飲料或食物
(C)經常改變姿勢 (D)常解尿

- 12 生產的啓動可能和下列何項因素有關？
(A)動情素下降 (B)黃體素增加
(C)胎兒腎上腺髓質素分泌減少 (D)前列腺素增加
- 13 陰道內診後，記錄 station：+4，其意義為何？
(A)胎兒先露部到達恥骨聯合上方 4 公分 (B)胎兒先露部到達恥骨聯合下方 4 公分
(C)胎兒先露部到達坐骨棘連線上方 4 公分 (D)胎兒先露部到達坐骨棘連線下方 4 公分
- 14 肌肉注射 Methergin 通常可在產程何時給與，以促進子宮收縮？
(A)胎兒著冠時 (B)胎兒前肩娩出後 (C)胎兒後肩娩出後 (D)胎盤娩出後
- 15 有關右枕前位「內轉」(Internal rotation)之敘述，下列何者正確？
(A)胎頭自 ROP 旋轉 45 度至 OA (B)胎頭自 ROP 旋轉 135 度至 OA
(C)胎頭自 ROA 旋轉 45 度至 OA (D)胎頭自 ROA 旋轉 135 度至 OA
- 16 第一產程過渡期階段，產婦大叫「我想大便」，此時護理人員最佳的措施為下列何者？
(A)馬上教導用力技巧 (B)協助產婦下床上廁所
(C)快速拿便盆給產婦使用 (D)請產婦先哈氣並立即內診
- 17 有關體外胎兒監測器的使用方法，下列何者正確？
(A)須在破水後使用 (B)監測時孕婦禁止下床活動
(C)監測時孕婦須一直保持仰臥姿勢 (D)超音波轉換器置於胎兒背部上方
- 18 待產婦使用胎兒監測器，若出現胎盤功能不足的現象時，下列何者為護理人員的優先措施？
(A)搖高床尾 (B)測量血壓脈搏 (C)協助採左側躺 (D)協助下床活動
- 19 子宮內避孕器置入子宮內的最適當時間點為：
(A)月經來前 1 週置入 (B)月經期置入 (C)產後 2 週置入 (D)產後 4~6 週置入
- 20 有關泌乳素的敘述，下列何者錯誤？
(A)吸吮乳頭可刺激泌乳素
(B)餵食後所分泌的泌乳素，將用以製造下一餐所需的乳汁
(C)白天泌乳素分泌較晚上高
(D)泌乳素可抑制排卵的發生
- 21 有關產後子宮的復舊過程，下列敘述何者錯誤？
(A)胎盤娩出後，子宮底位於肚臍和恥骨聯合連線的中點
(B)產後第 1 天，子宮底位於肚臍高度
(C)產後第 1 天以後，子宮底高度每天下降約一橫指
(D)子宮在產後 4 週即可恢復到懷孕前的大小和形狀
- 情況：李太太 G₁P₁，很有哺餵母乳的意願，請依此回答第 22~24 題。
- 22 當李太太問及回家後要如何判斷寶寶吃母乳的量是否足夠時，下列那項敘述錯誤？
(A)平均每 2~4 小時需要餵食 1 次，平均 1 天餵 8 次
(B)每天至少有 6 次小便，尿布重且尿的顏色不是深黃色
(C)每次吸吮 5 分鐘後，寶寶就安靜睡著了
(D)寶寶體重維持在生長曲線 30~50%
- 23 爲了教導李太太哺餵母乳正確的方法，以避免乳頭疼痛與破皮，下列那項敘述錯誤？
(A)確定每次銜含姿勢的正確
(B)常更換抱持姿勢，減少吸吮點固定造成的破皮
(C)停餵時先以小指放入寶寶嘴角使之鬆開，再移出乳頭
(D)餵奶後以酒精消毒乳頭，以保持乾燥
- 24 李太太想在母乳哺餵 6 個月後斷奶(離奶)，下列何者不適當？
(A)離奶前 1 週開始減少母乳哺餵(或擠奶)次數 (B)避免刺激乳房之措施，如熱敷、乳房按摩等
(C)每天攝取 3000 c.c.生麥芽水 (D)著合身且具支托性的胸罩
- 25 張太太自然生產，產後 3 小時，觸診子宮底的位置在腹部右側，此時合宜的護理措施為：
(A)立即給與子宮底環形按摩
(B)評估是否有膀胱脹的情形，並協助產婦排空膀胱後再評估
(C)立即通知醫師來處理
(D)不需任何處理，繼續觀察即可

- 26 丁太太第一胎，為剖腹生產，產後 16 小時尚未排氣，主訴腹脹不適，下列何項措施較適宜？
 (A)解開丁太太的束腹帶，使腹肌鬆弛，有助於腸蠕動之恢復
 (B)通知醫師給與丁太太口服軟便劑，以減少腸道對水分之吸收
 (C)協助丁太太多翻身活動，並給與薄荷油擦拭，以促進腸蠕動之恢復
 (D)給與甘油灌腸，並協助其飲用大量溫開水，以促進腸蠕動之恢復
- 27 當新生兒的肛溫、脈搏、呼吸數值為下列那一種情形時，應馬上通知醫生處理？
 (A)36.5、90、20 (B) 36.6、110、30 (C) 36.5、130、50 (D) 37、150、60
- 28 黃小妹出生 1 小時後，出現下列何種症狀應考慮為異常現象？
 (A)頭部左側出現產瘤 (B)呼吸有時不規則 (C)口鼻發紺 (D)出現驚嚇反射
- 29 新生兒體重 3000 公克，需要 120 大卡/公斤/天，以供應身體生長所需，如果 4 小時餵 1 次配方奶，每次需餵多少毫升？
 (A)60 毫升 (B) 90 毫升 (C) 120 毫升 (D) 150 毫升
- 30 陳小弟，足月剖腹產，出生第 5 天出院前測得血中膽紅素值為 10 mg/dL，陳小弟需接受何種處置？
 (A)留院觀察 (B)照光治療 (C)換血 (D)不需治療
- 31 梁女士妊娠 24 週，胎兒為臀位，發現已破水，此時護理措施不包括下列那項？
 (A)評估胎心率 (B)使用胎兒監測器 (C)通知醫師 (D)立即進行剖腹產準備
- 32 有關子宮外孕婦女的臨床症狀，下列敘述何者錯誤？
 (A)在懷孕早期有噁心、嘔吐現象
 (B)血液滲入腹腔時，會出現寇倫氏徵象 (Cullen's sign)
 (C)易發生大量鮮血從陰道流出
 (D)經歷單側性的腹部痙攣及壓痛
- 33 有關子癩前症孕婦之飲食指導，下列何者正確？
 (A)高蛋白質與高鈉飲食 (B)高蛋白質與低鈉飲食 (C)低蛋白質與高鈉飲食 (D)低蛋白質與低鈉飲食
- 34 朱太太，G₂P₁，懷孕 36 週，因產前出血入院，檢查為完全性前置胎盤，有關朱太太入院後之措施，下列敘述何者不適當？
 (A)常以陰道內診確定產前出血及產程進展之狀況
 (B)注意監測胎心音及母體血壓
 (C)建議朱太太臥床休息
 (D)向朱太太解釋，她有可能須採剖腹生產方式娩出胎兒
- 35 王太太妊娠 12 週，陰道點狀出血，經超音波確認胎兒心跳正常，此時最適當的照護措施為下列何者？
 (A)休息 24~48 小時，觀察陰道是否持續出血 (B)絕對臥床 24~48 小時，給與鎮定劑
 (C)建議做子宮頸擴張及刮除術 (D)給與抗生素預防感染
- 36 晚期產後出血最常見的原因為下列何者？
 (A)子宮張力不全 (B)產道撕裂傷 (C)胎盤碎片殘留 (D)瀰漫性血管內凝血
- 37 黃太太為糖尿病患者，其反覆多次感染相同症狀之陰道炎，下列何者敘述不適當？
 (A)黃太太血糖控制與其感染狀況有關 (B)黃太太個人衛生習慣與其感染狀況有關
 (C)黃太太應併用類固醇及廣效磺胺類抗生素治療 (D)配偶有時也需同時接受治療
- 38 有關生殖器疱疹之敘述，下列何者正確？
 (A)生殖器疱疹是指 HSV 第一型 (HSV-1) 感染
 (B)生殖器疱疹患者也是子宮頸癌及愛滋病高危險群
 (C)生殖器疱疹並不會經由產道垂直感染胎兒
 (D)與生殖器疱疹患者進行口交，並不會產生口腔疱疹
- 39 陰道受到正常菌叢的影響，因此能維持：
 (A)正常的酸性 (pH 4.0~5.0) 環境 (B)正常的中性 (pH 6.5~7.0) 環境
 (C)正常的鹼性 (pH 7.3~7.7) 環境 (D)正常的強鹼性 (pH 8.0~9.0) 環境
- 40 有關陰道滴蟲感染之敘述，下列何者正確？
 (A)陰道滴蟲性喜好氧的環境 (B)停經後婦女感染率較其他年齡層多
 (C)性交是唯一的感染途徑 (D)分泌物呈黏稠乳酪狀

- 41 有關青少年神經性厭食症 (Anorexia nervosa) 的行為特徵，下列何者錯誤？
(A) 自我催吐 (B) 服用瀉藥、利尿劑 (C) 甘願忍受飢餓 (D) 熬夜並減少活動
- 42 小平 8 個月大，每 4 小時喝 180 c.c. 牛奶，他 1 天攝取的熱量是多少 Kcal？
(A) 520 (B) 600 (C) 720 (D) 800
- 43 有關兒童中毒的急救措施，下列何者正確？
(A) 鐵劑中毒的兒童應先以活性碳來清除
(B) 誤食強酸的兒童應於 1 小時內給與吐根糖漿
(C) 乙醯胺酚 (Acetaminophen) 中毒可用催吐、洗胃，以減少藥物吸收
(D) 鉛中毒的兒童可給與靜脈輸注 Deferoxamine
- 44 評估新生兒眼睛的敘述，下列何者錯誤？
(A) 兩眼瞳孔間距小於 3.5 cm 者可能為唐氏症候群
(B) 視網膜正中凹未和黃斑完全分化，且睫狀肌未成熟，故影響眼睛協調能力
(C) 暫時性斜視可於 3~4 個月內逐漸恢復
(D) 出生 10 天內移動頭部時，眼睛並不會隨著轉動，仍留在原來位置
- 45 下列何者不是兒童重度燒傷的定義？
(A) 燒傷兒童年齡在 5 歲以上 (B) 全皮層燒傷面積超過全身體表面積 10%
(C) 燒傷範圍包括臉、手、腳及會陰部 (D) 有其他合併的損傷同時發生
- 46 為一位昏迷且疑似頸椎損傷的兒童施行急救時，應採取下列何種方式以維持其呼吸道通暢？
(A) 壓額提下巴法 (B) 推顎法 (C) 採復甦姿勢 (D) 仰臥將頭側向一邊
- 47 有關新生兒頭顱血腫 (Cephalohematoma) 的臨床表徵，下列敘述何者錯誤？
(A) 因分娩時壓力過大，造成骨膜下出血所致
(B) 又名先鋒頭，常合併頭皮損傷
(C) 血腫出現在一側，不會越過骨縫合線，且界線分明
(D) 於第 2、3 天時逐漸增大，出生後 6 週會自然吸收
- 48 陳小弟 3 歲，因肺炎住院治療，其在家已可用杯子喝水，但住院期間卻堅持用奶瓶喝水，此種行為屬於：
(A) 抗議行為 (B) 絕望行為 (C) 吸引他人注意行為 (D) 退行性行為
- 49 醫囑給與靜脈輸液 1500 c.c./day，若使用小兒精密輸液套管 (Micro set)，則每分鐘應維持約幾滴？
(A) 45 (B) 50 (C) 63 (D) 77
- 50 唇裂 (Cleft lip) 與腭裂 (Palate) 是嬰兒常見的先天異常問題，下列敘述何者正確？
(A) 為訓練合併唇腭裂嬰兒口腔肌肉，鼓勵以短且孔小的奶嘴餵食
(B) 餵奶時，讓嬰兒平躺，少量且緩慢餵食，以利吞嚥
(C) 若以塑膠滴管餵食，則塑膠滴管需要儘量靠近口腔的前面或臉頰內側面
(D) 單純的唇裂，仍可鼓勵母乳餵食，訓練口腔唇舌肌肉，並增進親子關係
- 51 6 個月大的嬰兒應該正在發展下列那一項動作？
(A) 不需支持能坐穩 (B) 翻身 (C) 以四肢爬行 (D) 拉住傢俱站起來
- 52 小華 5 個月，下列何種反射仍會存在？
(A) 驚嚇反射 (Startle reflex) (B) 爬行反射 (Crawling reflex)
(C) 手掌抓握反射 (Grasp reflex) (D) 巴賓斯基氏反射 (Babinski's reflex)
- 53 藥物成癮的母親所生下的新生兒，會出現藥物戒斷徵象，下列何者不是藥物戒斷徵象？
(A) 發燒 (B) 呼吸暫停 (C) 震顫 (D) 躁動
- 54 李小妹為妊娠 28 週出生之早產兒，插有氣管內管，護理人員維持李小妹氣管內管通暢之護理措施，下列何者正確？
(A) 經常給與抽痰，且抽吸壓力為 80~100 mmHg (B) 每 4 小時給與扣擊、震顫、姿位引流
(C) 每小時用聽診器聽診各肺葉的呼吸音 (D) 以氧氣治療維持血液中的 PaO₂ 為 35~50 mmHg
- 55 妊娠 28 週出生之男嬰，因母親胎盤早期剝離，以剖腹產方式娩出，出生後有呼吸困難、發紺現象，經診斷為呼吸道窘迫症候群 (Respiratory distress syndrome)。造成此症候群之可能因素為何？
(A) 28 週出生之早產兒體內表面張力素不足
(B) 母親胎盤早期剝離時的出血，造成早產兒缺氧
(C) 早產兒吸吮能力差，熱量攝取不足造成低血糖
(D) 母親剖腹產時的麻醉劑，造成早產兒呼吸抑制

- 56 有關 5~9 歲學齡期兒童對死亡的認識及反應，下列敘述何者正確？
(A)死亡是躺下來不能動，像睡美人一樣
(B)死亡是魔鬼的化身，只要躲起來，魔鬼找不著就不會死
(C)對死亡容易陷於哀傷、憤怒、怨恨等情緒
(D)死亡是不可避免的普遍現象
- 57 有關新生兒壞死性腸炎的敘述，下列何者錯誤？
(A)因腸黏膜細胞缺血壞死，細菌侵犯腸壁所致
(B)病變部位常發生在迴腸尾端，升結腸處
(C)腸壁內積氣、腹脹、嘔吐物含膽汁
(D)大便帶有腐臭、濃稠的脂肪
- 58 有關白喉、百日咳、破傷風三合一疫苗（DPT）的敘述，下列何者正確？
(A)接種後不會出現任何不適
(B)出生滿 2 週，無痙攣病史者即可接種
(C)應採肌肉注射
(D)國小一年級時要追加注射 DPT
- 59 下列何者不是麻疹常見的合併症？
(A)中耳炎
(B)肺炎
(C)腦炎
(D)胰臟炎
- 60 川崎氏症（Kawasaki disease）在急性期常使用阿斯匹靈（Aspirin），主要的目的為何？
(A)改善皮膚和指甲的屑狀脫皮現象
(B)預防發生腎衰竭的合併症
(C)抑制冠狀動脈瘤的發生及血栓的形成
(D)降低血壓
- 61 下列那種運動適合學齡期氣喘兒童？
(A)游泳、騎腳踏車
(B)長跑、打羽毛球
(C)踢足球、打躲避球
(D)溜直排輪、溜冰
- 62 下列何者是嬰兒罹患中耳炎最典型的臨床表徵？
(A)躁動不安、拉扯耳朵，甚至尖叫哭喊
(B)發燒及臉上出現紅疹
(C)失去聽力及鼻竇紅腫
(D)失去平衡感及呼吸短促
- 63 林小弟 2 歲半，因感染細菌性肺炎住院，痰黏稠且量多，無法有效咳出，為維持其呼吸道通暢的護理措施，下列何者正確？
(A)以鼻導管給與 100% 氧氣
(B)抽痰前，先做噴霧治療、姿位引流及扣擊
(C)抽痰時的壓力為 140 mmHg
(D)抽痰時，先抽口，再抽鼻
- 64 4 歲小華罹患法洛式四重畸形（Tetralogy of Fallot），矯正手術後，維持小華良好呼吸狀態的護理措施，下列何者不適當？
(A)手術前以遊戲方式教導深呼吸及有效咳嗽
(B)手術後每 1~2 小時為小華翻身，並鼓勵深呼吸及咳嗽
(C)手術後每 4 小時執行胸腔物理治療，協助排出痰液
(D)從氣管內管抽痰時間要超過 10 秒，抽痰後給與氧氣
- 65 小強 5 個月大，患有心臟衰竭，服用毛地黃（Digoxin），有關服用毛地黃的護理指導，下列那項不適當？
(A)心尖脈小於 100 次／分，則暫停服藥
(B)毛地黃不可與牛奶一起合併給與
(C)若小強服藥 30 分鐘後嘔吐，須重新給 1 次的劑量
(D)如忘記給藥超過 6 小時則不補給
- 66 有關先天性心臟病病童，其心臟腔室血液含氧濃度改變的敘述，下列何者正確？
(A)心室中隔缺損的病童，左心室的含氧濃度下降，右心室的含氧濃度上升，左、右心房的含氧濃度不變
(B)心房中隔缺損的病童，右心房、右心室的含氧濃度上升，左心房、左心室的含氧濃度不變
(C)開放性動脈導管的病童，左心房、左心室的含氧濃度下降，右心房、右心室的含氧濃度上升
(D)法洛氏四重畸形（Tetralogy of Fallot）的病童，左、右心房的含氧濃度不變，左、右心室的含氧濃度下降
- 67 有關 β 型地中海型貧血之敘述，下列何者錯誤？
(A)定期輸注濃縮紅血球
(B)發生率無性別差異
(C)出生時即有貧血症狀
(D)注射排鐵劑，減少血鐵沉著

- 68 護理人員在指導父母居家照顧其 3 歲的血友病幼兒時，下列原則何項不適宜？
(A) 選擇沒有尖銳邊緣之安全玩具
(B) 有出血情形時，患部應固定不動，並抬高出血部位至心臟高度以上
(C) 移除家中容易造成幼兒跌倒的物品
(D) 避免預防注射
- 69 甲狀腺功能低下症的患童口服 L-thyroxin 治療時，可能發生劑量過高的徵象，護理人員應指導家屬觀察下列何者？
(A) 嗜睡、體重上升 (B) 便秘、腹痛 (C) 心悸、過度興奮 (D) 皮膚炎、白血球減少
- 70 有關兒童腦瘤的敘述，下列何者正確？①常見的症狀為頭痛 ②頭痛在傍晚時最為嚴重 ③腦壓增高時，壓迫腦幹可能會有嘔吐的現象 ④依腫瘤的型態決定治療的方式（化療、放射治療或手術）
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ①③④ (D) ①②④
- 71 評估胰島素依賴型糖尿病（IDDM）兒童的治療效果時，應測試：
(A) 血清中胰島素含量
(B) 糖化血色素（Glycohemoglobin）
(C) 血色素電泳分析（Hemoglobin electrophoresis）
(D) 口服葡萄糖耐受性測驗（Oral glucose tolerance test）
- 72 有關兒童骨髓抽吸的部位，下列何者正確？
(A) 胸骨中央 (B) 後腸骨嵴 (C) 右側肋骨 (D) 腰椎
- 73 王小弟 4 個月大，持續腹瀉，下列護理措施何者不適當？
(A) 於臀部塗抹薄層之油劑（如凡士林），避免糞便直接刺激皮膚
(B) 打開尿布，讓臀部及會陰部暴露於空氣中，使其乾燥
(C) 每 4 小時使用烤燈，需距離臀部 20 公分，每次使用時間 1 小時
(D) 以中性溫和肥皂和清水清洗臀部後擦乾
- 74 有關尿道下裂的醫療處置，下列敘述何者錯誤？
(A) 重建手術後，男童能以站立姿勢小便，有利正向身體心像的建立
(B) 最理想的手術時間是在 3 歲以後，因為此時兒童的小便控制能力較好
(C) 術後可使用床上護架，以避免傷口部位受到被蓋、衣物等壓迫
(D) 術後應鼓勵兒童努力喝水及補充流質食物，以利尿路通暢，減少感染
- 75 有先天性的食道閉鎖和氣管食道瘻管的嬰兒，不會呈現下列何種臨床表徵？
(A) 嚴重嘔吐 (B) 咳嗽 (C) 哽噎、嗆到 (D) 發紺
- 76 有關蟻蟲感染的敘述，下列何者錯誤？
(A) 自體傳播方式：手到肛門處抓癢後進食 (B) 家庭傳播方式：吸入漂浮的蟲卵
(C) 蟲卵檢查方法：以膠帶黏拭肛門處 (D) 收集蟲卵時間：在晚上上床睡覺前
- 77 有關腦性麻痺之敘述，下列何者錯誤？
(A) 病童都會有智障的問題 (B) 為長時間的腦部缺氧所造成的腦部損傷
(C) 最常見的是痙攣型的腦性麻痺 (D) 單側輕偏癱的運動缺陷通常發生在上肢
- 78 有關柯林氏徵象（Kernig's sign）之敘述，下列何者正確？
(A) 抬起兒童的腿並彎曲膝蓋，當由膝蓋伸直腿時，會有阻力或引起疼痛
(B) 讓兒童平躺，當將其頭向上抬時，兒童會不自主的彎曲膝蓋及髖部
(C) 用指尖或反射錘的柄沿兒童之足跟往上劃過足外緣至大拇趾時，大拇趾會向上翹，其餘腳趾呈扇形張開
(D) 讓兒童俯臥，以大拇指沿其脊柱，自尾椎處往上壓至頸部，兒童會不自主抬頭
- 79 下列何者不是細菌性腦膜炎的臨床表徵？
(A) 畏光 (B) 布魯辛斯基氏徵象（Brudzinski's sign）(+)
(C) 頸部僵硬 (D) 巴羅氏徵象（Barlow's sign）(+)
- 80 重症肌無力的患童，最早出現的症狀為：
(A) 顏面神經麻痺 (B) 吞嚥困難 (C) 眼瞼下垂 (D) 說話不清