

98 年第一次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員（不含牙醫師、助產師、職能治療師）、中醫師、心理師、營養師考試暨醫師考試分試考試試題

代號：4110
頁次：6-1

等 別：高等考試
類 科：護理師
科 目：產兒科護理學
考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)本試題禁止使用電子計算器。

- 一般來說，妊娠期間心臟負荷增加，橫膈膜被子宮壓迫，使心臟如何移位？
(A)向左上 (B)向左下 (C)向右上 (D)向右下
- 李小姐急切想知道自己是否懷孕，下列何種檢體可最快確認受孕？
(A)尿液 (B)血液 (C)唾液 (D)陰道分泌物
- 林女士第一胎，目前懷孕 38 週，她告訴護理師說：「睡覺到半夜，突然發現褲子濕了，因此趕到醫院來」，此時護理師應採取何項措施以確定原因？
(A)驗尿檢查 WBC (B)抽血檢查 CRP
(C)以石蕊試紙測試陰道流出物 (D)做陰道分泌物培養
- 下列何項是臍帶受壓迫的結果？
(A)早發性胎心音減速 (B)晚發性胎心音減速
(C)嚴重末期性胎心音減速 (D)變異性胎心音減速
- 林小姐有施打海洛因習慣，目前懷孕 28 週，下列敘述何者正確？
(A)繼續施打低劑量海洛因，以避免驟然戒斷危急胎兒 (B)以嗎啡替代使用
(C)胎兒會有臉部異常 (D)胎兒出生須觀察有無海洛因戒斷症候群
- 林太太第一次懷孕，目前懷孕 8 週，她抱怨先生對於懷孕並不興奮，照樣加班，無視她懷孕。護理師應如何回答較適當？
(A)「妳先生的確太不體貼。」 (B)「妳先生不喜歡表達內心的情感。」
(C)「妳先生正在適應準父親角色。」 (D)「男人都是這樣，妳不要太敏感了。」
- 陳女士目前已懷孕 34 週，她開始計劃為新生兒添購玩具、衣服、用品等。她告訴護理師，很怕自己會生下早產兒，護理師較適當的回應為：
(A)「妳可以請醫師為妳執行陰道內診。」 (B)「為什麼妳會擔心這個呢？」
(C)「這是妳計劃中的懷孕嗎？」 (D)「妳可以增加產檢的次數。」
- 妊娠婦女陰道易受白色念珠菌感染之原因為何？
(A)黃體激素刺激使黏膜變薄，陰道 pH 值上升
(B)陰道血流量增加 pH 值上升，可抵抗細菌入侵
(C)子宮頸腺體增生陰道 pH 值下降，有利酵母菌生長
(D)陰道血流量增加 pH 值下降，不利細菌及酵母菌生長
- 有關 Rubin 所提出第三妊娠期婦女心理變化之敘述，下列何項正確？
(A)關心胎兒，並幻想胎兒的長相 (B)感覺自己體重增加後變得笨拙，希望胎兒趕快出生
(C)對懷孕感到懷疑及不確定 (D)開始感受到胎動，而有驕傲及滿足感
- 在胎兒生理活動評估 (biophysical profile) 項目中，何者不須使用超音波掃描？
(A)無壓力試驗 (B)胎兒呼吸運動 (C)胎兒身體張力 (D)羊水量
- 林太太第一胎，晚上感到子宮收縮，到院檢查，護理師以胎兒監視器測得其子宮收縮為每 5~10 分鐘一次，陰道內診發現子宮頸未開，此時最合宜之護理措施為何？
(A)準備剃陰毛 (B)告知禁食 (C)協助點滴注射 (D)鼓勵散步
- 引發分娩的相關因素，下列何者正確？
(A)雌性素減少 (B)黃體激素增加 (C)催產素減少 (D)前列腺素增加
- 李太太懷孕 40 週，因超音波預估胎兒重量 3900 公克而準備入院引產，護理師在陰道內診後，使用比夏計分系統 (Bishop score) 評估，分數至少要達幾分，引產才較容易成功？
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10

- 14 有關胎盤剝離的敘述，下列何者正確？
(A)通常胎盤剝離發生在嬰兒出生 30 分鐘之後
(B)胎兒娩出之後到胎盤娩出前，產婦不會主訴子宮收縮
(C)出血主要是胎盤之羊膜的海綿層發生剝離，逐漸與子宮壁分離
(D)平均失血量約 200~300c.c.
- 15 有關以 Oxytocin 催生，下列敘述何者正確？
(A)有尿崩症之合併症
(B)用於橫位孕婦之引產
(C)可將其加入 5% 葡萄糖水中稀釋做靜脈滴注
(D)可連續滴注 72 小時
- 16 李太太第一胎，目前子宮頸開 8 公分，胎頭高度為+1，有便意感，此時最合宜之護理指導為何？
(A)協助李太太用力
(B)協助李太太下床
(C)運用腹部皮膚輕觸按摩法以轉移其注意力
(D)運用呼吸方法以避免用力
- 17 有關真痛 (labor pain) 的敘述，下列何者正確？
(A)子宮收縮會讓子宮頸變薄
(B)子宮收縮不規則
(C)通常走動會減輕不適
(D)疼痛集中在腹股溝部位
- 情況：護理師做晨間護理時，產後第一天的王太太不斷的敘述著昨天的生產經過，並抱怨下次再也不要生了，對於新生兒是女孩，感到非常不滿意，言談中眼睛也不時閃著淚水。請回答第 18~19 題。
- 18 此時護理師最適宜的護理措施是：
(A)為增強親子關係，鼓勵哺餵母乳
(B)轉移其不滿的情緒
(C)告知女孩男孩一樣好
(D)鼓勵她說出生產的感受
- 19 護理師依據魯賓 (Rubin) 對產後婦女行為態度之研究結果判斷，王太太此時的心理狀態是處於：
(A)興奮期
(B)緊執期
(C)接受期
(D)放手期
- 20 產後若子宮底的位置較高又偏離中線，最可能的原因為何？
(A)膀胱脹尿
(B)宮縮不好
(C)胎盤未剝離乾淨
(D)惡露聚積未排出
- 21 有關產後子宮復舊及評估的敘述，下列何者錯誤？
(A)如膀胱脹滿，子宮收縮會更硬
(B)當子宮呈球狀硬塊時，即可不須按摩
(C)子宮收縮弛緩可能是感染所造成的
(D)子宮鬆弛須進一步評估惡露量、味、性質
- 22 若 1 小時內惡露量在產墊上的面積約 5 吋，評估結果為下列何者？
(A)大量
(B)中量
(C)小量
(D)微量
- 23 下列哺餵母乳的方式，何者對增加嬰兒的營養最有利？
(A)每次餵奶時，每一側乳房均須輪流吸吮 5 分鐘
(B)儘可能吸吮一側乳房 15 分鐘以上，直至嬰兒自己鬆開，下一次再由另一側乳房開始餵奶
(C)兩次哺餵母乳之間，給予少量牛奶，以補充母乳營養之不足
(D)母親食用豬肝炒韭菜，以促進乳汁分泌並增加營養
- 24 產後排乳 (let-down) 反射主要是因為下列何種賀爾蒙之影響所致？
(A)催產素 (oxytocin)
(B)黃體激素 (progesterone)
(C)雌性素 (estrogen)
(D)泌乳激素 (prolactin)
- 25 有關母乳與配方奶粉的比較，下列何者錯誤？
(A)母乳乳糖含量較高
(B)母乳含乳酪蛋白較高
(C)配方奶粉含飽和脂肪酸比率較高
(D)配方奶粉含鐵鈣濃度較高
- 26 將未結合性膽紅素轉變為結合性膽紅素的是下列何種器官？
(A)脾
(B)腎
(C)肝
(D)胃
- 27 下列何者不是第三妊娠期常見的出血原因？
(A)葡萄胎
(B)前置胎盤
(C)胎盤早期剝離
(D)早產
- 28 下列何種新生兒生理特徵是異常現象？
(A)出生第二天，發現女嬰會陰部有紅色分泌物
(B)出生第二天，前囟門膨出
(C)出生第三天，身體皮膚出現毒性紅斑
(D)男嬰乳房有充盈現象
- 29 HELLP 症候群之敘述，下列何者正確？
(A)通常發生在第二妊娠期
(B)H 是指羊水過多 (hydramnios)
(C)EL 是指胎心音早期減速
(D)LP 是指血小板減少症

情況：丁太太G₁P₀，妊娠 12 週，早晨起床後自覺下腹酸痛，陰道並有點狀出血，至門診檢查。請回答第 30~31 題。

- 30 醫師診察結果：丁太太的子宮頸未開，超音波檢查胎兒狀況正常，胎心音也在正常範圍，胎盤功能正常。則下列處置何者正確？
 (A) 給予硫酸鎂 (MgSO₄) 安胎，並鼓勵丁太太增加運動量，以防止藥物副作用
 (B) 給予黃體激素服用，並鼓勵丁太太多臥床休息
 (C) 給予 Yutopar 靜脈注射，並採絕對臥床，包括床上大小便
 (D) 給予肌肉鬆弛劑服用，可維持正常的工作量與生活作息
- 31 丁太太持續有點狀出血，但妊娠 18 週時，出血量增多、下腹部痙攣合併子宮頸擴張、羊膜破裂，胎兒已無法保留。下列何者符合丁太太目前的情形？
 (A) 早產 (B) 迫切性流產 (C) 習慣性流產 (D) 子宮頸閉鎖不全
- 32 有關胎兒發生 Rh 因子過敏反應之敘述，下列何者正確？
 (A) 母親為初產婦 Rh (+)，胎兒為 Rh (-)，父親為 Rh (-)
 (B) 母親為初產婦 Rh (-)，胎兒為 Rh (+)，父親為 Rh (+)
 (C) 母親為經產婦 Rh (+)，胎兒為 Rh (-)，父親為 Rh (-)
 (D) 母親為經產婦 Rh (-)，胎兒為 Rh (+)，父親為 Rh (+)
- 33 下列何者不是骨盆構造的一部分？
 (A) 髖骨 (B) 薦骨 (C) 尾骨 (D) 股骨
- 34 陳小妹心跳速率 105 次/分，呼吸速率不規則，四肢屈曲張力佳，以吸球抽吸時面部扭曲，軀幹粉紅四肢發紺，以阿帕嘉 (Apgar) 評分系統評估時，陳小妹的得分應為多少？
 (A) 5 分 (B) 6 分 (C) 7 分 (D) 8 分
- 35 針對經前症候群，下列何種護理措施最合適？
 (A) 多攝取咖啡，以減輕偏頭痛的情形
 (B) 自在放鬆的做肢體運動，以增加全身氧氣及舒適
 (C) 使用類固醇類藥物，以緩解症狀
 (D) 臥床休息，以減輕水腫不適
- 36 有關子宮頸癌疫苗接種之敘述，下列何者錯誤？
 (A) 預防子宮頸癌效果達 95% 以上 (B) 最佳接種的年齡約在青少年時期
 (C) 接種對象以尚無性經驗者最佳 (D) 注射後，仍須定期接受子宮頸抹片檢查
- 37 有關婦女更年期可能出現的熱潮紅與下列何者有關？
 (A) 黃體激素增加 (B) 黃體激素減少 (C) 動情素增加 (D) 動情素減少
- 38 有關預防陰道感染的方法，下列敘述何者錯誤？
 (A) 養成正確如廁習慣，由前往後擦拭
 (B) 經常以乳酸菌溶液做陰道灌洗
 (C) 多食用乳酸菌、蔓越莓，以維持陰道的酸性環境
 (D) 穿著透氣的棉質內褲
- 39 張女士待產時胎心率發生變異性減速 (variable deceleration)，此時護理師應最先執行的護理措施為下列那一項？
 (A) 抬高張女士頭部 (B) 觀察陰道有無出血
 (C) 測量生命徵象 (D) 協助張女士改變臥姿，如採膝胸臥式
- 40 下列那一種癌症，初期毫無症狀，等到發現症狀時已進入末期，且被認為是中老年婦女最危險的一種生殖器官疾病？
 (A) 卵巢癌 (B) 子宮頸癌 (C) 乳癌 (D) 陰道癌
- 41 謝小弟，體重 8 公斤，不慎燙傷，送入急診，經評估為二度燒傷，燒傷面積為 25%，最初 24 小時須緊急輸注乳酸林格氏溶液 (Lactated Ringer's solution) 800c.c.，其最初 8 小時的輸液量應為多少 c.c.？
 (A) 100 (B) 200 (C) 400 (D) 600
- 42 由一位急救人員為 10 歲兒童施行心外按摩時，心外按壓與人工呼吸的比例應為多少？
 (A) 5 : 1 (B) 5 : 2 (C) 15 : 2 (D) 30 : 2
- 43 有關兒童血液系統之解剖生理特性的敘述，下列何者正確？
 (A) 顆粒性白血球中以嗜鹼性白血球數目最多，約占 62%
 (B) 胎兒型血紅素由 2 α 及 2 γ 血球蛋白鏈所組成
 (C) 淋巴球正常壽命為 120 天
 (D) 衰老的血小板大部分從腎臟排出

- 44 有關兒童汽車安全座椅的敘述，下列何者錯誤？
(A) 3 個月以下的嬰兒，須在頸部兩側放置支撐物
(B) 體重未達 10 公斤的嬰兒，可坐在後座放置的安全座椅，面向車尾
(C) 體重 10~18 公斤的幼童，可在後座由家人抱著，並共繫安全帶
(D) 體重 18~36 公斤的兒童，應坐在後座，並使用安全帶
- 45 護理人員做身體檢查評估時，發現王小弟心臟聽診有明顯的心雜音，觸診有震顫，以心雜音六級強度來記錄，下列何者正確？
(A) II/VI (B) III/VI (C) IV/VI (D) VI/VI
- 46 有關新生兒篩檢的敘述，下列何者正確？
(A) 出生滿 72 小時或餵奶滿 48 小時後方可採血
(B) 檢驗前新生兒必須禁食 8 小時，且膽紅素值低於 15 gm/dL
(C) 採血穿刺部位宜選擇耳垂、手指或腳趾
(D) 新生兒有餵食問題或黃疸等異狀時，才須做新生兒篩檢
- 47 依丹佛 II 嬰幼兒發展篩檢測驗，百分之九十嬰幼兒能走得很穩的年齡為何？
(A) 9 個月大 (B) 12 個月大 (C) 15 個月大 (D) 20 個月大
- 48 有關給予一位 5 歲兒童耳朵滴藥的護理注意事項，下列何者錯誤？
(A) 應先將耳藥溫熱至與體溫相同 (B) 應將兒童耳廓向上及向後拉
(C) 給藥後應躺向患側 5~10 分鐘 (D) 輕輕按摩耳前方以利藥液流入耳道
- 49 有關兒童腦性麻痺型態的敘述，下列何者錯誤？
(A) 運動失調型乃因小腦功能病變，會出現跨大步伐
(B) 痙攣型會出現伸展反射及肌肉張力增加
(C) 手足徐動型主要因基底核及錐體外病變，而產生不自主運動
(D) 無張力型其肌肉呈規律性的不隨意運動
- 50 有關病理性黃疸之敘述，下列何者錯誤？
(A) 出生 24 小時內出現黃疸 (B) 易發生於 Rh (+) 的母親懷 Rh (-) 的胎兒時
(C) 足月兒黃疸症狀持續 1 星期以上 (D) 每日增加膽紅素 > 5 mg/dL
- 51 懷孕週數約 36 週時，羊水中的卵磷脂／抱合髓磷脂 (lecithin/sphingomyelin) 之比值至少要達到多少時，才表示胎兒可產生足夠的表面張力素 (surfactant) ？
(A) 0.5 (B) 1 (C) 1.5 (D) 2
- 52 4 歲小花最近遭遇母親死亡的經歷，根據此年齡對死亡的理解，小花可能會說什麼？
(A) 「我的媽媽死了，爸爸會再幫我找個新媽媽。」
(B) 「我媽媽死了，但是我很快就可以再見到她。」
(C) 「我想我媽上天堂了，有一天我死了，我會去見她。」
(D) 「爸爸說天使帶媽媽上天堂了，為什麼天使只帶她去？」
- 53 下列何者是早產兒壞死性結腸炎 (necrotizing enterocolitis) 的早期徵兆？①胃餘量增加 ②腹脹 ③痙攣 ④體溫不穩 ⑤心搏過速
(A) ①②④ (B) ①③④ (C) ②③⑤ (D) ②④⑤
- 54 有關疫苗種類及特性之說明，下列何者正確？
(A) b 型流行性嗜血桿菌 (Hib) 疫苗是一種活病毒疫苗
(B) 破傷風疫苗是一種用加熱或化學方式來降低毒性效果之類毒素
(C) 麻疹疫苗是一種已被殺死的微生物病原之死病毒疫苗
(D) 小兒麻痺疫苗是一種改變微生物基因重組的疫苗
- 55 林小弟自出生即按時接種疫苗，現在滿 6 個月，今日來衛生所接受預防注射，尚不能接種的疫苗為：
(A) B 型肝炎疫苗第三劑 (B) 白喉、百日咳、破傷風疫苗第三劑
(C) 小兒麻痺口服疫苗第三劑 (D) 麻疹、德國麻疹、腮腺炎混合疫苗第一劑
- 56 有關腮腺炎之敘述，下列何者正確？
(A) 不是傳染性疾病，不須採取隔離措施 (B) 只侵犯嬰幼兒及兒童期孩童，易合併中耳炎
(C) 前驅或發病期皆無明顯不適症狀或發燒 (D) 由於咀嚼時會疼痛不適，應採流質或軟質飲食

- 57 林小弟，4 歲，罹患肺炎，有呼吸困難現象，護理人員為其做胸部評估不會發現下列何種徵象？
(A)視診：可看到鼻翼煽動 (B)視診：吸氣時，可看到肋間肌凹陷
(C)聽診：兩側肺葉有喘鳴聲 (D)叩診：肺部出現鈍音
- 58 抽痰前不宜將生理食鹽水滴入氣管內管或氣切套管的主要理由為何？
(A)會使痰液量增加，致病童不易將痰液排出
(B)生理食鹽水附著在抽痰管壁，會增加呼吸道阻力
(C)會使病童血氧飽和度降低 (desaturation)，且增加院內感染
(D)會增加病童耗氧 (O₂ consumption) 及二氧化碳滯留 (CO₂ retention)
- 59 林小弟，6 歲，每日白天都有氣喘症狀，平時有慢性咳嗽或呼吸喘鳴聲，一星期內發作 2 次，夜間症狀更明顯，發作時會影響活動及睡眠。依據以上敘述，林小弟屬於那一層級氣喘發作？
(A)輕度間歇性氣喘 (B)輕度持續性氣喘 (C)中度持續性氣喘 (D)重度氣喘
- 60 王小弟，10 歲，診斷為破傷風，下列護理措施何者錯誤？
(A)告知王小弟及其家屬戴口罩，做呼吸道隔離
(B)咽喉痙攣會造成肺部擴張不全及肺炎
(C)保持環境安靜，避免聲光刺激，以防止強直性痙攣之發生
(D)在病人單位備氣管切開術用具，以備不時之需
- 61 根據全球氣喘倡議組織 (Global Initiative of Asthma; GINA) 2006 版之診療指引，下列何者是氣喘治療階段的指標？
(A)氣喘兒童的罹病時間 (duration of illness)
(B)氣喘的控制程度 (level of control)
(C)氣喘兒童的最大肺活量 (forced vital capacity)
(D)氣喘兒童的呼吸道再塑造 (airway modeling) 情形
- 62 心室中隔缺損病童，接受心導管檢查，其結果會呈現下列何種現象？
(A)左心室的含氧濃度下降，壓力下降 (B)右心室的含氧濃度上升，壓力上升
(C)右心房的含氧濃度上升，壓力上升 (D)左心房的含氧濃度下降，壓力上升
- 63 偉偉，6 歲，因罹患法洛氏四重畸形 (Tetralogy of Fallot's) 住院接受開心手術治療，下列敘述何者錯誤？
(A)術前若出現缺氧發作，可採膝胸臥式，增加下肢靜脈血回流至心臟
(B)術前 24 小時會停止使用毛地黃藥物
(C)可藉嚴密監測病童的尿量來了解心輸出量
(D)手術後每 4 小時執行胸腔物理治療，協助排出痰液
- 64 有關開放性動脈導管 (patent ductus arteriosus) 的敘述，下列何者正確？
(A)血液會由主動脈流向肺靜脈
(B)肺血流增加，肺部壓力增高
(C)心音聽診時，會出現舒張期心雜音
(D)可給予前列腺素 E₁ (Prostaglandin E₁; PGE₁)，以促使關閉
- 65 江小弟被診斷為 A 型的血友病，下列敘述何者錯誤？
(A)A 型血友病是指血漿中缺乏第九凝血因子 (B)出血時間正常
(C)凝血酶原時間 (PT) 呈現正常 (D)血小板數目及形狀正常
- 66 寶弟，10 歲，患有鎌狀細胞貧血 (sickle cell anemia)，今因出現血管阻塞危機 (vaso-occlusive crisis) 及關節疼痛而入院治療，下列那種護理措施最能有效處理其關節疼痛的問題？
(A)冷敷疼痛部位及給予口服阿司匹靈 (Aspirin) 止痛
(B)用冷敷減輕疼痛，並要求他臥床休息或安排繪畫、靜態遊戲
(C)用熱敷減輕疼痛，並鼓勵大量飲水
(D)用熱敷消腫，並鼓勵他在可以忍受的程度下活動
- 67 有關兒童白血病的敘述，下列何者正確？
(A)骨髓性白血病占兒童白血病的 80%
(B)目前兒童白血病的治療以骨髓移植為主
(C)較大兒童的骨髓穿刺，通常採後側腸骨嵴的部位
(D)在化學治療的鞏固期最容易出現感染及自發性出血
- 68 秀秀，10 歲，診斷為第 1 型糖尿病，護理人員和秀秀的父母、老師討論秀秀在學校呈現低血糖症狀時，須及時補充糖類飲食，但下列何種情況不宜補充糖類飲食？
(A)胸痛、嘔吐、呼吸帶有水果味 (B)發抖、冒冷汗、皮膚濕冷、臉色蒼白
(C)頭昏、頭痛、全身無力 (D)飢餓、噁心、心悸、心跳加速

- 69 小明罹患第 1 型糖尿病，下列何者不是酮酸中毒的血液檢驗結果？
(A)低血鈉 (B)高血鉀
(C)重碳酸氫鈉低於 15 mEq/dL (D) pH 值少於 7.3
- 70 5 個月的嬰兒被診斷為呆小症 (cretinism)，其最有可能的原因是下列何者？
(A)尿素合成代謝障礙 (urea cycle disorder) (B)高苯丙胺酸血症 (hyperphenylalaninemia)
(C)甲狀腺素缺乏 (thyroxine deficiency) (D)高膽紅素血症 (hyperbilirubinemia)
- 71 吳小妹，罹患白血病，化學治療期間血液檢查結果：絕對嗜中性白血球 (ANC) 數目為 $320/\text{mm}^3$ ，血小板為 $11 \times 10^4/\text{mm}^3$ ，紅血球為 $3.1 \times 10^6/\text{uL}$ ，血色素為 10 gm/dL。依據檢查結果，下列護理措施何者適當？
(A)吳小妹易感染，須採保護性隔離措施
(B)須觀察皮膚、小便及大便情形，以早期發現自發性出血狀況
(C)因紅血球不足，須限制活動，減少耗氧量
(D)鼓勵攝入含鐵量高的食物，以提升血色素值
- 72 有關膽道閉鎖 (biliary atresia) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)因缺乏膽素，大便呈灰白色 (B)無法吸收鐵質及水溶性維生素
(C)肝外膽管阻塞最好 2 個月大時，即進行外科手術 (D)須攝取高蛋白低脂飲食
- 73 有關腸套疊 (intussusception) 的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)突然出現嚴重腹痛 (B)解出草莓果醬樣大便
(C)腹瀉，且嘔吐物不含膽汁 (D)觸診右上腹部，可摸到香腸樣腫塊
- 74 有關急性腎絲球性腎炎 (acute glomerulonephritis; AGN) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)主要由於上呼吸道或皮膚曾受到 A 群 β 型溶血性鏈球菌的感染
(B)病童在急性期時，會出現無尿或少尿情形
(C)急性期時會出現代謝性鹼中毒
(D)蛋白尿約 3+ 至 4+
- 75 小玉，7 歲，母親發現她的腹圍最近增大許多，經醫師檢查，確定小玉罹患威廉氏腫瘤 (Wilm's tumor)，小玉手術前的護理措施，下列何者不適當？
(A)每日觸診小玉腹部，測量腫瘤大小，並用按摩方式，減輕腹部腫脹
(B)術前要特別監測血壓，注意高血壓徵候
(C)利用畫圖或可以移除腎臟的布娃娃，向小玉解釋她的病情與治療
(D)告訴家屬，小玉手術後還須做化學治療與放射線治療
- 76 有關因輪狀病毒 (rotavirus) 感染引起腸胃炎的敘述，下列何者正確？
(A)好發於 6 個月~2 歲的嬰幼兒 (B)主要傳染途徑為飛沫傳染
(C)夏天的發生率較高 (D)全家人均須檢查有無帶原
- 77 4 歲大的水腦症 (hydrocephalus) 兒童，在其右側置入腦室-腹膜分流管 (ventriculoperitoneal shunt; V-P shunt)，術後立即性的姿勢應該是：
(A)右側臥，床尾提高 (B)左側臥，床頭提高 (C)俯臥，床頭提高 (D)仰臥，床頭放平
- 78 有關脊柱側彎 (scoliosis) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)可發生於任何年齡，最常出現在青春期男孩 (B)做彎腰動作時，背部呈現明顯的突峰
(C)可能影響肺部換氣 (D)早期病童可以游泳來作為治療性運動
- 79 有關先天性髖脫位 (congenital dislocation of the hip) 的檢查方式，下列何者符合卡列阿齊氏徵象 (Galeazzi's sign) 陽性的敘述？
(A)當患肢單腳站立時，健肢髖部由原來正常高度向下傾斜
(B)仰臥，將髖關節屈曲成 90 度時，可發現患肢的膝蓋頂點較健肢低
(C)將患肢腿屈曲做外展運動，可聽到股骨頭滑過髖臼緣的卡答聲
(D)略施壓力於不穩定性的髖部，做大腿上下運動，可感覺股骨頭在關節囊內滑動
- 80 有關熱性痙攣 (febrile convulsion) 的敘述，下列何者正確？
(A)好發於 7 歲以上的兒童
(B)在夏季，兒童體溫會隨著環境溫度升高，而發生抽搐
(C)痙攣發生於發燒 24 小時後
(D)痙攣的特性呈現強直-陣攣性 (tonic-clonic) 抽搐