

98 年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員（不含牙醫師、助產師、職能治療師）、中醫師、心理師、營養師考試暨醫師考試分試考試、98 年專門職業及技術人員高等考試法醫師考試試題

代號：4110
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：護理師

科 目：產兒科護理學

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆 在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
(三)本試題禁止使用電子計算器。

- 一般胎兒的枕下前囟徑為幾公分？
(A) 12.5 公分 (B) 12 公分 (C) 11 公分 (D) 9.5 公分
- 陳小姐 28 歲，在月經前一週感覺精神不佳，易怒且有偏頭痛情形，月經來臨後症狀就緩解改善，最正確的護理評估結果為何？
(A) 子宮內膜炎 (B) 子宮內膜異位 (C) 經前症候群 (D) 精神官能症
- 細菌性陰道炎的常見致病原為：
(A) 披衣菌 (B) 金黃色葡萄球菌 (C) 白色念珠菌 (D) 陰道滴蟲
- 下列那種前置胎盤孕婦，陰道生產仍為優先選擇之生產方式？
(A) 邊緣性前置胎盤 (B) 低位性前置胎盤 (C) 部分性前置胎盤 (D) 完全性前置胎盤
- 糖尿病母親所生的新生兒，最容易發生下列何種問題？
(A) 體溫調節困難 (B) 產生低血糖 (C) 受到感染 (D) 氣胸
- 產後於恥骨聯合上方約 5 公分觸診到一小球的彈性組織感覺，且扣診為頓音，最可能是下列何者？
(A) 收縮的子宮底 (B) 胎盤殘餘組織 (C) 膀胱脹滿尿液 (D) 惡露凝結聚積
- 當產婦於產後發生子宮收縮弛緩時，護士應採取何項護理措施？
(A) 鼓勵多攝取水分 (B) 按摩子宮
(C) 給予口服 PARLODEL 藥物 (D) 鼓勵臥床休息
- 陰道內診無法獲得下列何項資料？
(A) 子宮頸變薄程度 (B) 子宮頸擴張程度 (C) 胎兒下降高度 (D) 胎兒頭臀長度
- 丁太太使用催產素引產，以每小時 9c.c. 靜脈滴注，胎兒監視器顯示胎心音早期減速，此時最合宜之措施為何？
(A) 停止催產素 (B) 給予氧氣
(C) 準備剖腹產 (D) 密切觀察，不需特殊處理
- 有關妊娠週數與子宮底高度的敘述，下列何者正確？
(A) 第一妊娠期子宮底高度尚在骨盆腔內，無法由腹部觸摸到
(B) 妊娠 20~24 週宮底高度約在臍平處
(C) 妊娠 28~32 週宮底高度達到最高
(D) 第二妊娠期經產婦易因胎頭降入骨盆腔，宮底高度隨之降低
- 遺傳諮詢過程的第一個步驟應該是下列何者？
(A) 特殊診斷 (B) 瞭解家族史 (C) 產前檢查 (D) 婚前檢查

- 12 使婦女子宮黏膜產生清澈透明液體的主要荷爾蒙為：
- (A)黃體素 (Progesterone) (B)雌性素 (Estrogen)
(C)前列腺素 (Prostaglandin) (D)濾泡促激素 (Follicle-stimulating hormone)
- 13 下列何者為待產婦之異常症狀與徵象？
- (A)宮縮持續時間超過 90 秒
(B)子宮口全開已經 1.5 小時，但是胎兒尚未娩出
(C)子宮頸口開 9 公分，但是待產婦有向下用力的感覺
(D)子宮口全開，宮縮時用力胎頭會下降，但間歇期胎頭卻又內縮
- 14 巫太太為 B 型肝炎帶原者，其表面 (HbsAg) 及核心 (HbeAg) 抗原均為陽性反應，為避免巫太太的新生兒垂直感染 B 型肝炎，下列敘述何者正確？
- (A)不宜哺餵母乳，並於出生後立即注射第一劑 B 型肝炎疫苗
(B)不宜哺餵母乳，並於出生後立即注射一劑 B 型肝炎免疫球蛋白
(C)應採母乳哺餵，並於出生後立即注射第一劑 B 型肝炎疫苗
(D)應採母乳哺餵，並於出生後立即注射一劑 B 型肝炎免疫球蛋白
- 15 張太太 G₁P₀ 妊娠 30 週，於診所測得之體重較上次產檢增加 1 公斤，血壓值為 160/100 mmHg，醫師診斷為子癇前症，下列何項症狀符合張太太之診斷？
- (A)蛋白尿試紙測試為陰性 (B)僅腳掌有水腫情形
(C)有陣攣性痙攣 (D)測肱二頭肌反射評分為+3
- 16 新生兒先天性代謝疾病篩檢項目中，下列何項檢查不受出生日數及進食狀況的限制，並可由臍帶血中測得正確之結果判讀？
- (A)先天性甲狀腺低功能症
(B)苯酮尿症
(C)半乳糖血症
(D)葡萄糖-六-磷酸鹽脫氫酶缺乏症 (俗稱蠶豆症)
- 17 有關骨盆腔炎的敘述，下列何項正確？
- (A) 85%的骨盆腔炎是經由性病感染 (B)主要致病原是白色念珠菌
(C)肺結核菌經由淋巴管上行至生殖器官 (D)診斷方法是以超音波或放射線為準
- 18 張太太血清中德國麻疹抗體的效價為 1:128，下列相關敘述何者正確？
- (A)張太太具有免疫力
(B)效價不足，若妊娠末期感染德國麻疹胎兒易有先天性畸形
(C)第三妊娠期感染，不管效價高低均建議放棄胎兒
(D)張太太不具免疫力，應立即接受疫苗注射
- 19 胎盤早期剝離與前置胎盤之鑑別性特徵比較，下列胎盤早期剝離之敘述，何者正確？
- (A)腹部較少疼痛表現 (B)腹部觸診呈現如木板狀的堅硬
(C)陰道易有大量出血現象 (D)胎心音不會隨子宮灌流減少而改變

- 20 江太太 38 歲，G₁P₀，妊娠 16 週時接受羊膜穿刺術檢查，發現胎兒為血友病患。有關胎兒狀況之敘述，下列何者正確？
- (A)血友病為基因突變，因江太太為高齡妊娠婦
 - (B)血友病為性聯遺傳，每胎得病之機率是固定的
 - (C)血友病為體染色體顯性遺傳，江太太必為血友病患
 - (D)血友病為體染色體隱性遺傳，江姓夫婦皆有血友病基因
- 21 鄭小姐G₁P₁產後第二天，採母嬰同室，剛剛餵過奶，鄭小姐上過廁所後臥床休息，新生兒睜著眼，爸爸微笑凝視緊抱著並小聲對他說話，下列何種護理人員態度最合宜？
- (A)爸爸能共同參與新生兒的親密互動，是很好的開始
 - (B)新生兒最好有固定的照顧者，讓媽媽來照顧就可以了
 - (C)爸爸抱的姿勢有問題，為了新生兒的安全，最好放回床上
 - (D)新生兒吃飽該睡了，就讓他安靜的躺下睡覺吧
- 22 林小弟出生第一天，媽媽發現林小弟臉上及手臂上有膿疱，下列敘述何者錯誤？
- (A)膿疱通常是由於新生兒感染金黃色葡萄球菌所造成
 - (B)膿疱破裂會形成厚、濕、黃色的痂
 - (C)膿疱須依醫囑使用抗生素藥膏局部治療
 - (D)治療約 10~14 天可痊癒
- 23 有關胎便的敘述，下列何者錯誤？
- (A)胎便主要是由上皮細胞、膽汁、胰液和腸道分泌物、胎毛以及胎兒吞下的羊水所組成
 - (B)胎兒腸道中的胎便正常是不會排出的，若缺氧則會使肛門括約肌鬆弛而將胎便排到羊水中
 - (C)新生兒出生後 6 小時內無法排胎便則須做進一步評估
 - (D)新生兒出生後，柏油狀、黏性的胎便解出會持續 2~3 天
- 24 魯賓（Rubin）認為產後那一期，產婦會將注意力轉至新生兒，並主動學習照顧新生兒？
- (A)接受期（Taking-in Phase）：產後 2~3 天
 - (B)緊執期（Taking-hold Phase）：產後 3~10 天
 - (C)放手期（Letting-go Phase）：產後 10 天至 3 個月
 - (D)恢復期（Recovery Phase）：產後 3 個月以後
- 25 有關避孕針劑的原理，下列敘述何者錯誤？
- (A)利用高劑量的動情素
 - (B)抑制下視丘—腦下垂體軸的功能
 - (C)干擾精卵的運送
 - (D)干擾子宮內膜的發育
- 26 有關母乳的敘述，下列何者錯誤？
- (A)初乳含有免疫球蛋白 IgA
 - (B)前乳脂肪含量是後乳的 2~3 倍
 - (C)初乳對新生兒有輕瀉作用
 - (D)母乳中長鏈多元不飽和脂肪酸較配方奶粉高
- 27 待產婦因低張性子宮功能收縮不良而接受剖腹產手術，手術後應優先注意下列何項？
- (A)腸胃蠕動情形
 - (B)子宮收縮情形
 - (C)尿瀦流情形
 - (D)傷口疼痛情形
- 28 第二產程時，對產婦使用傳統生產檯的適當安置及照顧，下列敘述何者錯誤？
- (A)頭部抬高 30 至 60 度，以枕頭或支持者協助支撐產婦的頭及背部
 - (B)勿使用腳凳，以免導致產後血栓性靜脈炎
 - (C)隨時都要有人陪伴產婦
 - (D)覆蓋產婦身體，只露出會陰

- 29 夏太太因破水至產房診視，有關測試破水之敘述，下列何者正確？
(A)使用 nitrazine 試紙測試，如破水會變成紅色
(B)使用 nitrazine 試紙測試，如破水會變成黃色
(C)臨床上較常使用 Rubin test
(D)羊齒試驗必須在顯微鏡下觀看，呈現羊齒狀代表已破水
- 30 護理人員評估第三妊娠期的準父親出現下列何種行為時，表示其最可能有適應不良的情形？
(A)擔心自己在太太生產時無法提供合適的支持 (B)購買新生兒用物
(C)擔心自己無法成爲好爸爸 (D)懷疑這個孩子不是他的
- 31 林女士，懷孕 38 週，因子宮規則收縮入院待產，護士詢問她的妊娠史，她回答說生過二胎，4 週時人工流產一次，第二胎是雙胞胎，則她的孕產史應記爲：
(A)G₅P₃A₁ (B)G₃P₂A₁ (C)G₄P₃A₁ (D)G₄P₂A₁
- 32 王小姐，22 歲，孕前身高 170 cm，體重 60 kg，目前懷孕 20 週，體重爲 64 kg。她告訴護理人員覺得自己變太胖，決定要減重。護理人員的回應何者較適當？
(A)體重剛好，不需減重 (B)體重增加太多，現在要減重
(C)體重過重，但產後再減 (D)體重增加不足，可增重
- 33 不孕症婦女治療中發生卵巢過度刺激症候群的護理措施，下列何者錯誤？
(A)評估有否下腹部悶痛及少尿等現象 (B)需每天測量體重與腹圍
(C)臥床時下肢勿超過心臟高度 (D)採低鈉高蛋白飲食
- 34 孫小姐第一胎，出院前詢問護理人員新生兒一個月內要如何以感官刺激，以利新生兒發展，下列建議何者錯誤？
(A)新生兒偏愛黑白對比色，你可以選黑白色吊飾給他看
(B)新生兒有遠視，在 1 公尺以外還看得清楚
(C)新生兒有聽的能力，你可以多與他說話
(D)新生兒有皮膚觸覺刺激的需要，可以多擁抱及按摩
- 35 下列何者表示待產婦有心臟衰竭的前兆？①脈搏 > 100 次/分 ②脈搏 < 60 次/分 ③呼吸速率 > 24 次/分 ④呼吸速率 < 10 次/分 ⑤呼吸困難 ⑥痙攣 ⑦血小板計數減少 ⑧視力模糊
(A)①⑤⑧ (B)①③⑤ (C)②④⑥ (D)②⑦⑧
- 情況：腦下垂體分泌之荷爾蒙，分別爲：①濾泡促激素 (FSH) ②黃體促激素 (LH) ③泌乳激素 (Prolactin) ④促甲狀腺素 (TSH) ⑤腎上腺皮質激素 (Adrenotropin) ⑥催產激素 (Oxytocin) ⑦升壓素 (Vasopressin)。依此回答第 36 題至第 37 題。
- 36 作用於乳腺並能促進乳汁分泌之相關荷爾蒙爲：
(A)①② (B)③④ (C)③⑥ (D)⑥⑦
- 37 影響母親的代謝而滋養胎兒生長的荷爾蒙爲：
(A)①② (B)④⑤ (C)⑤⑦ (D)②④
- 情況：李太太 G₁P₁，很有哺餵母乳的意願，依此回答第 38 題至第 40 題。
- 38 當李太太問及回家後要如何判斷寶寶吃母乳的量是否足夠時，下列何者爲護理人員的正確指導？
(A)平均每 2~4 小時需餵食 1 次，平均一天餵 8 次 (B)每次餵奶都有少量之大便
(C)每次吸吮 5 分鐘後就安靜睡著了 (D)寶寶體重每月至少增加 0.2 公斤以上

- 39 護理人員教導李太太哺餵母乳正確的方法，以避免乳頭疼痛與破皮，下列何者正確？
- (A)拉長哺餵時間，減少乳頭刺激
 - (B)常更換抱持姿勢，減少造成吸吮點固定而破皮
 - (C)餵奶時若感乳頭疼痛，立即移出乳頭，減少乳頭刺激
 - (D)餵奶前後以酒精消毒乳頭，以保持清潔乾燥
- 40 如果李太太想在母乳哺餵 6 個月後斷奶（離奶），應如何提供衛教？
- (A)每天攝取 2000~3000c.c.生麥芽水
 - (B)避免如熱敷、乳房按摩等刺激乳房之措施
 - (C)離奶前一週開始不要哺餵母乳或擠奶
 - (D)若有乳房疼痛情形，可服用止痛劑緩解
- 41 有關燒傷兒童復健期返家之護理指導，下列何者不適當？
- (A)藉由正確的姿勢、夾板固定或運動訓練，預防肢體攣縮
 - (B)已癒合的表層燒傷植皮區，需防日曬，沐浴後以乳液擦拭
 - (C)燒傷的幼兒在傷口癒合後，應 24 小時穿戴彈性衣，抑制疤痕增生
 - (D)鼓勵家中成員、同儕探視燒傷的兒童，協助其接受新的身體心像
- 42 王小妹今年 6 歲，由媽媽送至醫院急診就診，媽媽主訴王小妹騎腳踏車不慎，摔下來撞到頭。護理人員發現王小妹身上多處瘀傷，臀部及大腿有新舊不一的燙傷。下列護理過程何者不恰當？
- (A)立即採取隔離保護措施，避免王小妹的媽媽接近王小妹
 - (B)詢問王小妹受傷的時間、地點及事情發生的經過
 - (C)評估王小妹的身心發展及行為態度
 - (D)24 小時內向主管機關報備
- 43 有關嬰幼兒呼吸系統的敘述，下列何者錯誤？
- (A)嬰兒喉部與淋巴組織數量較成人多，呼吸道感染時容易有充血、水腫、聲音沙啞等症狀
 - (B)嬰幼兒的歐氏管（耳咽管）較成人短、寬且直，故易引發中耳炎
 - (C)嬰幼兒的胸腔小，呼吸肌肉尚未成熟，因而呼吸力量較薄弱，呼吸深度較成人表淺
 - (D)嬰幼兒會厭軟骨所占的比例比成人小，柔軟且無彈性，易形成呼吸道阻塞
- 44 兒童鉛中毒時，下列那一個系統功能受損最為嚴重？
- (A)腎臟
 - (B)血液
 - (C)呼吸
 - (D)中樞神經
- 45 嬰幼兒的大便訓練通常是在何時完成？
- (A)半歲
 - (B)1 歲半
 - (C)2 歲半
 - (D)3 歲半
- 46 依據艾瑞克森（Erikson）理論，4 歲孩童的發展處於何種階段？
- (A)自主性對羞恥與懷疑（autonomy versus shame and doubt）
 - (B)認同感對角色混淆（identity versus role confusion）
 - (C)進取性對罪惡感（initiative versus guilt）
 - (D)勤奮對自卑（industry versus inferiority）
- 47 小華 3 歲因肺炎住院，給予口服藥時，小華拒絕，並大叫「不要！不要！」，下列何項護理措施最合宜？
- (A)請母親協助約束小華，再予灌藥
 - (B)告知小華不吃藥就要打針
 - (C)告知小華不吃藥就不能回家
 - (D)給予小華選擇，要自己服藥或讓母親協助餵藥

- 48 下列何者不是阿帕嘉計分系統 (Apgar score system) 評分之項目？
(A)心跳速率 (B)呼吸狀況 (C)膚色 (D)哭泣聲音
- 49 學步期兒童之遊戲特點是：
(A)平行遊戲 (B)獨自遊戲 (C)聯合遊戲 (D)合作遊戲
- 50 依照丹佛 II 嬰幼兒發展篩檢，百分之九十滿 4 個月大的嬰兒，其發展應可完成下列何者？
(A)從臥位拉兒童坐起時，頭不會向後倒 (B)會發出單音
(C)會注意自己的手 (D)能伸手抓物
- 51 新生兒敗血症 (Neonatal sepsis) 早期的臨床表徵為何？①體溫過高或過低 ②呼吸暫停 ③黃疸
④嗜睡 ⑤抽搐
(A)①③⑤ (B)②③④ (C)②④⑤ (D)①②④
- 52 張小弟，4 歲，因肺炎住院一週，接受許多侵入性的檢查及治療，看到醫護人員就感到害怕。此時護理人員進行治療性遊戲之目的為何？
(A)向張小弟說明其疾病發生的原因 (B)向張小弟解釋治療檢查的必要性
(C)評估張小弟的生長發育狀況 (D)藉由遊戲過程紓解張小弟的害怕情緒
- 53 小慧，12 歲，患有幼年型糖尿病，已開始接受胰島素治療，下列何種情形容易引發酮酸中毒？
(A)運動量過於劇烈 (B)發燒、感染 (C)胰島素注射過量 (D)正餐的時間延後
- 54 呼吸道窘迫症候群 (Respiratory distress syndrome) 是因新生兒體內缺乏何種物質？
(A)黃體素 (Progesterone) (B)睪固酮 (Testosterone)
(C)前列腺素 (Prostaglandin) (D)表面張力素 (Surfactant)
- 55 一位妊娠 42 週診斷為胎便吸入症候群 (Meconium aspiration syndrome) 的新生兒，會出現下列何種表徵？
(A)腸蠕動減少、腹脹 (B)呼吸窘迫 (C)過度興奮、抽搐 (D)體溫不穩
- 56 新生兒因高膽紅素血症接受照光治療，下列何者不是照光時可能產生的副作用？
(A)綠色軟便 (B)脫水 (C)體溫不穩定 (D)角弓反張
- 57 早產兒因生理機能尚未成熟所引發的合併症，不包括下列何者？
(A)視網膜病變 (B)腦室內出血 (C)開放性動導管 (D)胎便吸入症候群
- 58 按照行政院衛生署疾病管制局之預防接種時間表，15 個月的幼兒應接受下列何項預防注射？
(A)日本腦炎疫苗 (B)小兒麻痺口服疫苗 (C) A 型肝炎疫苗 (D) B 型肝炎疫苗
- 59 克沙奇病毒 (Coxsackie Virus) 的傳播途徑為何？①血液感染 ②呼吸道分泌物 ③糞口途徑 ④病媒傳播
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 60 有關氣喘病童居家照護的指導內容，下列何者正確？
(A)家中使用羽毛被、毛毯 (B)採用布質窗簾
(C)運動種類宜以有氧運動為主 (D)運動過程中，隨時補充水分，並以口呼吸
- 61 為兒童進行呼吸系統評估時，聽到喉鳴音 (Stridor)，可能的原因為何？
(A)小孩常有的喉部吵雜音，長大就會自然改善 (B)氣喘即將發作的前兆
(C)上呼吸道發炎或有異物阻塞的情形 (D)呼吸道中有含水分多的分泌物

- 62 兒童充血性心衰竭的症狀不包括那些？①心搏過速 ②呼吸急促 ③心臟擴大 ④高血壓 ⑤肝臟腫大 ⑥低血鉀
(A)①② (B)③⑤ (C)④⑥ (D)②③
- 63 小玲，1 歲半，因心室中隔缺損（Ventricular Septal Defect），入院接受心導管檢查，有關護理人員提供之術後護理措施，下列何者錯誤？
(A)情況穩定前，每 30 分鐘評估生命徵象一次，心搏速率須測量至少 30 秒
(B)以砂袋加壓 2~4 小時以止血，並觀察穿刺部位敷料上有無出血現象
(C)導管插入部位的遠端脈搏，必須與另一肢體作對稱性的比較
(D)觀察及比較兩側肢體對稱部位之膚色及溫度
- 64 下列那一種先天性心臟病會引起杵狀指及紅血球增生的情形？
(A)開放性動脈導管（Patent Ductus Arteriosus；PDA）
(B)心房中隔缺損（Atrial Septal Defect；ASD）
(C)主動脈狹窄（Coarctation of Aorta；COA）
(D)法洛氏四重症（Tetralogy of Fallot；TOF）
- 65 有關 β 型海洋性貧血（ β -Thalassemia）的敘述，下列何者錯誤？
(A)屬體染色體隱性遺傳的一種溶血性貧血的疾病
(B)通常在出生後 1 年時，會出現貧血現象，如：臉色蒼白、容易疲倦、頭暈等
(C)患童的脾臟因紅血球的破壞而增大，為降低紅血球的破壞可考慮作脾臟切除手術
(D)為預防因血液中過多的鐵質沈著而造成患童器官受損，可服用排鐵劑如 deferoxamine（Desferal）
- 66 有關再生不良性貧血（Aplastic Anemia）之敘述，下列何者錯誤？
(A)不可以使用 Aspirin 退燒 (B)仔細觀察皮膚、尿液、糞便有無出血現象
(C)當白血球下降時，需採嚴密的保護隔離 (D)血小板有代償性增生情形
- 67 有關絕對嗜中性白血球（absolute neutrophil count；ANC）的敘述，下列何者正確？
(A)ANC 是確立白血病緩解與否之重要依據，需大於 $500/\text{mm}^3$ 才理想
(B)ANC 數目計算方法是 WBC 數目乘以成熟及未成熟的嗜中性白血球（segs+bands）的總百分比
(C)ANC 數目計算方法是 WBC 數目乘以淋巴球（lymphocytes）所占百分比
(D)ANC 數目會隨著孩童年齡的增加而自然增高
- 68 珊珊 8 歲，診斷為第 1 型糖尿病（type 1 DM），過去一個月會有下列何種臨床表徵？
(A)精力旺盛，活動增加 (B)常覺得口渴，大量飲水
(C)體重明顯上升 (D)食慾變差
- 69 有關罹患半乳糖血症（Galactosemia）新生兒的敘述，下列何者錯誤？
(A)是一種體染色體隱性遺傳疾病
(B)檢驗血液與尿液，發現含有高量的半乳糖
(C)只能哺餵母乳，禁餵牛奶或一般配方奶粉
(D)未及時治療會造成智力受損、視覺感覺障礙及生長遲滯
- 70 小芳今年 5 歲，因發燒、疲倦、刷牙時牙齦出血來院就診，血液檢查呈現血紅素 10.6 gm/dL 、白血球 $18000/\text{mm}^3$ ，血小板 $31000/\text{mm}^3$ ，經骨髓穿刺檢查，確定為急性淋巴性白血病，隨後開始緩解誘導的化學治療，下列護理措施何者正確？
(A)預防感染、治療期間禁止所有訪客
(B)避免活動造成出血、採絕對臥床休息
(C)使用軟毛牙刷或棉棒作口腔清潔
(D)建議多補充蓮霧、芭樂、草莓、棗子等新鮮水果

- 71 君君 6 歲，罹患神經性尿崩症，目前接受血管收縮素（DDAVP）治療，有關出院的居家照顧，需指導家屬注意觀察之藥物過量的症狀，不包括下列何者？
(A)頭痛 (B)噁心 (C)嘔吐 (D)多尿
- 72 6 個月大的嬰兒患有胃食道逆流，對其父母的護理指導，下列何者正確？
(A)暫停哺餵母乳 (B)兩餐之間，多餵食果汁
(C)進食後，嬰兒宜採左側臥 (D)鼓勵及早餵食半流體軟質食物，如麥片糊
- 73 安安 9 個月大，因為尿路感染而住院。經檢查後確認為膀胱輸尿管逆流（vesicoureteral reflux）第二級，有關檢查結果，護理人員如何向母親解說較適當？
(A)安安的情況只有極輕度逆流，約在 1 歲左右可以自行改善
(B)安安的情況可以在適當的抗生素治療及預防尿路感染的措施下改善
(C)安安的情況需要進一步外科處理，但是預後通常都很良好
(D)安安的情況並不是造成尿路感染的主要原因
- 74 唇腭裂修補手術，一般認為最好在兒童 2 歲以前完成，其最主要考量的原因為何？
(A)避免影響牙齒排列與發育 (B)可進食固體食物，避免影響生長
(C)避免嗆奶，以降低吸入性肺炎的機率 (D)避免影響發音學習和語言的發展
- 75 陳小弟 6 個月，體重 8 公斤，因腹瀉入院治療，護理人員評估其臨床表徵，發現其體重現為 7.3 公斤、黏膜乾燥、皮膚彈性差、尿量減少，則其脫水程度應屬：
(A)輕度 (B)中度 (C)重度 (D)極重度
- 76 下列何者不是兒童脊柱側彎（scoliosis）的徵象？
(A)彎腰時，背部可見到單側突出 (B)兩側手腳之粗細有顯著差異
(C)站立時，兩邊髖部及肩部高度不同 (D)會有背痛不適的主訴
- 77 有關脊髓脊膜膨出（myelomeningocele）嬰兒的護理措施，下列何者錯誤？
(A)每日量腹圍 (B)協助嬰兒側臥或垂頭俯臥
(C)以無菌生理食鹽水、綿布敷蓋於膨出囊上 (D)提供嬰兒被動性運動及視聽覺刺激
- 78 小偉 8 歲，突然全身性強直—陣攣性發作，診斷為癲癇，醫囑服用抗癲癇藥物，小偉的母親非常擔心小偉的病情及安全。護理人員的指導，下列何者正確？
(A)小偉使用抗癲癇藥物期間可控制病情，不會再發作，故可放心
(B)癲癇會突然發作而發生危險，故不可讓小偉參與戶外活動
(C)癲癇病童通常會合併智能障礙的問題，故在課業上不宜對小偉有所要求
(D)規律服用抗癲癇藥物對小偉很重要，不可突然停藥
- 79 1 歲的小明因股骨骨折，以布萊安特氏（Bryant）牽引器牽引，下列敘述何者正確？
(A)髖關節屈曲 90°，臀部微離床面，兩腳向上做牽引
(B)患肢和身體呈直角向上牽引，健肢採舒適臥位
(C)平躺，患肢用外固定器固定後向下牽引
(D)側躺，將患肢固定以砂袋向下牽引
- 80 下列何者為臺灣地區最常見的氣喘過敏原？
(A)花粉 (B)塵蟎 (C)海鮮 (D)病毒