

等 別：高等考試  
類 科：醫事檢驗師  
科 目：微生物學及臨床微生物學（包括細菌與黴菌）  
考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。  
(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。  
(三)本試題禁止使用電子計算器。

- 下列何種菌適合作為 Chocolate agar 的品管測試菌株，及其品質合格者應有何種結果？  
(A) *Streptococcus pneumoniae*；火山口型菌落 (B) *Haemophilus influenzae*；生長良好  
(C) *Proteus mirabilis*；游走性菌落 (D) *Serratia marcescens*；粉紅色菌落
- 檢測細菌 indole test 之陽性反應呈下列何種顏色？  
(A) 黃橙色 (B) 灰黑色 (C) 藍綠色 (D) 紫紅色
- 以 Andrade's acid fuchsin 為酸鹼指示劑之培養基，若細菌能代謝培養基中特定醣類，則呈下列何種反應？  
(A) 從淡黃色轉粉紅色 (B) 從淡紫色轉黃色 (C) 從淡紅色轉黃色 (D) 從淡綠色轉黃色
- PCR 反應步驟中，DNA denaturation 溫度的設定，下列何者較適合？  
(A) 50~58°C (B) 72°C  
(C) 94°C (D) 視目標 DNA 長度而定
- 下列何者是構成細菌細胞壁之主要成分？  
(A) peptidoglycan (B) lipoglycan (C) deoxyribonucleic acid (D) glycocalyx
- 下列何種波長的紫外線 (UV) 殺菌力最強？  
(A) 254 nm (B) 295 nm (C) 350 nm (D) 400 nm
- 下列何種菌屬於 D 群鏈球菌，其常見於腸道正常菌群，但若從血液分離出時，應檢查病人是否罹患結腸癌？  
(A) *Enterococcus faecalis* (B) *Enterococcus faecium*  
(C) *Streptococcus bovis* biotype I (D) *Streptococcus intermedius*
- 可以利用 carbon dioxide 作為唯一 carbon 來源的細菌稱為：  
(A) autotrophic (B) heterotrophic (C) mesotrophic (D) chemotrophic
- 下列試驗中，何者無法用於區別 *Streptococcus pneumoniae* 與 viridans streptococci？  
(A) Optochin 感受性試驗 (B) Bile-solubility test  
(C) 以肺炎雙球菌莢膜抗血清做 Quellung reaction test (D) 在綿羊血 BAP 上之溶血型
- 下列何者為 A 群鏈球菌 (*Streptococcus pyogenes*) 最主要的毒力因子 (virulence factor)，同時也可以作為進一步分型的依據？  
(A) Protein A (B) Capsule (C) Streptolysin S (D) M protein
- 下列有關 *Listeria monocytogenes* 與 *Streptococcus agalactiae* 的敘述，何者錯誤？  
(A) CAMP test 均為陽性反應 (B) 在 BAP 生長均呈現 β 溶血  
(C) Catalase test 均為陽性反應 (D) 均能水解 hippurate
- 葡萄球菌性脫皮症候群 (Staphylococcal scalded skin syndrome) 是由於 *Staphylococcus aureus* 產生何種毒素所致？  
(A) β-hemolysin (B) Exfoliatin (epidermolytic toxin)  
(C) Enterotoxin F (D) Toxic shock syndrome toxin-1
- 下列有關痰直接抹片抗酸染色鏡檢的敘述，何者正確？  
(A) 迅速的檢驗方式 (B) 痰抹片陰性的檢體，即代表病人未罹患肺結核  
(C) 可用以區別結核分枝桿菌與非結核分枝桿菌 (D) 診斷的敏感度高於培養方法
- 操作 Tube coagulase test 時，宜使用下列何種試劑？  
(A) EDTA 抗凝的人類血漿 (B) EDTA 抗凝的兔子血漿  
(C) Sodium citrate 抗凝的人類血漿 (D) Sodium citrate 抗凝的兔子血漿
- 金黃色葡萄球菌所產生的溶血素中，何者是一種 hot-cold hemolysin，可與 CAMP factor 產生協同溶血作用 (synergistic hemolysis)？  
(A) α-溶血素 (α-hemolysin) (B) β-溶血素 (β-hemolysin)  
(C) γ-溶血素 (γ-hemolysin) (D) δ-溶血素 (δ-hemolysin)
- 下列何者不是 *Corynebacterium diphtheriae* 的特性？  
(A) 染色鏡檢下出現中國字樣特徵 (Chinese letter character)  
(B) 具有異染顆粒 (metachromatic granules)  
(C) 無法生長於 Tinsdale 培養基中  
(D) 無法水解 esculin

- 17 下列何種試驗無法用來區別 *Listeria monocytogenes* 與 *Erysipelothrix rhusiopathiae* ?  
(A) H<sub>2</sub>S production (B) Hippurate hydrolysis (C) Nitrate reduction (D) CAMP test
- 18 下列有關 *Bacillus cereus* 的敘述，何者錯誤？  
(A) 嘔吐型 (emetic form) 腸毒素又稱為短潛伏型，對熱穩定  
(B) 腹瀉型 (diarrheal form) 腸毒素又稱為長潛伏型，對熱不穩定  
(C) 由患者糞便中分離出 *Bacillus cereus*，即可做出 *Bacillus cereus* 感染的確認診斷  
(D) *Bacillus cereus* 為桿菌型全眼球炎 (*Bacillus panophthalmitis*) 的病原
- 19 下列何者最可能在 TSIA 上呈現 K/A 及 H<sub>2</sub>S (+) ?  
(A) *Shigella sonnei* (B) *Escherichia coli* (C) *Serratia marcescens* (D) *Proteus mirabilis*
- 20 下列何者在 citrate 反應出現綠色？  
(A) *Klebsiella pneumoniae* (B) *Serratia marcescens* (C) *Shigella sonnei* (D) *Salmonella* spp.
- 21 腸內桿菌培養於 Moeller's decarboxylase test medium 後，若變為黃色混濁表示：  
(A) decarboxylation 發生 (B) peptone 被分解  
(C) lactose 被發酵產酸 (D) dextrose 被發酵產酸
- 22 臨床上 δ-aminolevulinic acid (ALA)-porphyrin test 通常用於鑑定何種細菌？  
(A) *Gardnerella vaginalis* (B) *Legionella* spp. (C) *Haemophilus* spp. (D) *Brucella* spp.
- 23 下列何者為氧化酶陽性且無運動性的非發酵性革蘭氏陰性桿菌？  
(A) *Acinetobacter* spp. (B) *Flavobacterium* spp. (C) *Alcaligenes* spp. (D) *Pseudomonas* spp.
- 24 下列何種方法可以區分 *Haemophilus influenzae* 與 *Haemophilus haemolyticus* ?  
(A) 培養於兔子血 BAP，觀察溶血性 (B) 培養於綿羊血 BAP，觀察溶血性  
(C) X factor 及 V factor 需求試驗 (D) δ-aminolevulinic (ALA) test
- 25 退伍軍人症 (Legionnaires' disease) 與下列何者具有相同的致病原？  
(A) Q fever (B) Typhoid fever (C) Relapsing fever (D) Pontiac fever
- 26 進行下列何種分離菌之鑑定時，需要生物安全等級 3 (BSL-3) 之防護？  
(A) *Mycoplasma pneumoniae* (B) *Francisella tularensis*  
(C) *Haemophilus ducreyi* (D) *Neisseria gonorrhoeae*
- 27 *Vibrio cholerae* 除了 serogroup O1 之外，近年來還有那一群也會產生 cholera toxin，而造成霍亂的流行？  
(A) O27 (B) O129 (C) O139 (D) O157
- 28 下列何種試驗可用來區分 *Aeromonas* 與 *Plesiomonas* ?  
(A) Oxidase 試驗 (B) Inositol 之發酵試驗 (C) 0% NaCl 生長試驗 (D) 6% NaCl 生長試驗
- 29 下列何種細菌之 oxidase 反應呈陰性？  
(A) *Alcaligenes faecalis* (B) *Pseudomonas aeruginosa*  
(C) *Stenotrophomonas maltophilia* (D) *Vibrio cholerae*
- 30 下列何者的菌落特色為扁平擴散、邊緣不規則、β-溶血、帶有葡萄芳香味，並且產生色素使培養基呈藍綠、紅或棕色？  
(A) *Burkholderia pseudomallei* (B) *Pseudomonas aeruginosa*  
(C) *Acinetobacter baumannii* (D) *Stenotrophomonas maltophilia*
- 31 *Pseudomonas aeruginosa* 與 *Pseudomonas stutzeri* 可以使用下列何種方法區分？  
(A) 細胞色素氧化酶試驗 (B) 運動性 (C) Pyocyanin 色素 (D) OF 乳糖試驗
- 32 對於 Hugh-Leifson OF 培養基的敘述，下列何者錯誤？  
(A) 含 0.3% agar (B) 含 20% peptone  
(C) 含 1% 測試糖 (D) 含 bromothymol blue 當作 pH 指示劑
- 33 下列何種 *Brucella* spp. 之生長最可能需要 CO<sub>2</sub> ?  
(A) *B. abortus* (B) *B. canis* (C) *B. melitensis* (D) *B. suis*
- 34 下列有關 *Neisseria meningitidis* 之敘述，何者錯誤？  
(A) 經飛沫傳染人類，常棲息在鼻咽黏膜  
(B) 屬革蘭氏陰性雙球菌，濕度及 CO<sub>2</sub> 有利其生長  
(C) Oxidase 陰性，superoxid test 陽性  
(D) 能在 Modified Thayer Martin agar (MTM) 生長，在 BAP 也可生長
- 35 下列何者為臨床最常培養出且具高度抗藥性之厭氧菌？  
(A) Non-pigmented *Prevotella* (B) *Clostridium botulinum*  
(C) *Clostridium tetani* (D) *Bacteroides fragilis*
- 36 下列何者不是厭氧菌之發酵途徑的最終能量電子接受者？  
(A) O<sub>2</sub> (B) Pyruvic acid (C) Lactic acid (D) Ethanol
- 37 下列何種方法常用於將不能自然發生 transformation 的細菌，製備成“人為勝任細胞”(artificially competent cells)，以便將特定 DNA 送入菌體內？  
(A) 短波或中波紫外光照射  
(B) γ-射線或 x-射線照射  
(C) 氯化鈣熱休克處理 (CaCl<sub>2</sub>-heat shock) 或電穿孔法 (electroporation)  
(D) 高壓氧處理

- 38 引起回歸熱 (relapsing fever) 之病原菌為：  
 (A) *Borrelia burgdoferi* (B) *Borrelia recurrentis* (C) *Leptospira interrogans* (D) *Leptospira noguchii*
- 39 下列何種血清型 (serotypes) 的砂眼披衣菌 (*Chlamydia trachomatis*) 會引起 Lymphogranuloma venereum ?  
 (A) A,B,C (B) D,F,G (C) L<sub>1</sub>,L<sub>2</sub>,L<sub>3</sub> (D) B,J,K
- 40 下列有關肺炎黴漿菌 (*Mycoplasma pneumoniae*) 之敘述，何者錯誤？  
 (A) 引起 walking pneumonia (B) 又稱為 T-strain mycoplasma  
 (C) 可以用適當培養基培養分離 (D) 可以用血清學方法檢測肺炎黴漿菌感染
- 41 Sulfonamides 是作用於細菌的何種酵素而導致葉酸代謝路徑中斷？  
 (A) Dihydropteroate synthetase (B) Dihydrofolate reductase  
 (C) DNA gyrase (D)  $\beta$ -lactamase
- 42 對 chloramphenicol 的抗藥性主要由下列何種機制影響？  
 (A) acetyltransferase (B)  $\beta$ -lactamase (C) phosphotase (D) methylase
- 43 下列何種遺傳機轉 (genetic mechanism) 對 vancomycin 具高度抗藥？  
 (A) *vanD* (B) *vanB* (C) *vanC* (D) *vanA*
- 44 下列何種抗生素是作用於細菌 DNA gyrase ?  
 (A) colistin (B) polymyxin B (C) ciprofloxacin (D) tetracycline
- 45 治療梅毒的首選抗生素為：  
 (A) Penicillin G (B) Dapsone (C) Erythromycin (D) Clindamycin
- 46 當以 disk diffusion 進行藥敏測試時，若發生有 2 圈抑制環時，則下列敘述何者錯誤？  
 (A) 判讀最外側的直徑 (B) 有突變株 (C) 不是單一菌種存在 (D) 必須重新分離培養
- 47 下列何種狀況不會造成藥敏試驗 false resistance ?  
 (A) Agar 厚度太厚 (B) 種菌量過多 (C) 種菌量過少 (D) 抗生素過期
- 48 下列何者為 Macrolides 類抗生素？  
 (A) Azithromycin (B) Amikacin (C) Ciprofloxacin (D) Colistin
- 49 下列有關酒精消毒法的敘述，何者正確？  
 (A) 可消滅芽胞及病毒 (B) 95% 比 70% 消毒效果好  
 (C) 可使菌體蛋白質變性，以達消毒效果 (D) 只能抑制細菌的生長，無法殺滅細菌
- 50 下列何者不為  $\beta$ -lactams 類抗生素？  
 (A) imipenem (B) penicillin (C) cefazolin (D) linezolid
- 51 臨床上所使用之抗黴菌藥物 Azoles 類，其作用機轉主要是抑制真菌細胞膜之何物的合成，進而影響細胞膜之構造及功能？  
 (A) chitin (B) peptidoglycan (C) ergosterol (D) DNA 和 RNA
- 52 *Escherichia coli* 的何種致病型會引起出血性尿毒症 (hemolytic-uremic syndrome) ?  
 (A) EPEC (B) EHEC (C) ETEC (D) EIEC
- 53 膀胱穿刺尿檢體欲進行厭氧培養時，可先接種在何種培養液？  
 (A) GN broth (B) Alkaline peptone water (C) Thioglycollate broth (D) BHI broth
- 54 對於李斯特桿菌 (*Listeria monocytogenes*) 的增殖方法可以使用下列何者來進行？  
 (A) 冷增殖法 (cold enrichment) (B) 冷凝集法 (cold agglutination)  
 (C) 熱處理法 (heat treatment) (D) 熱休克法 (heat shock)
- 55 常從心內膜炎或血液培養中分離到的 HACEK 菌中，下列何者不包括在內？  
 (A) *Haemophilus aphrophilus* (B) *Cardiobacterium hominis* (C) *Escherichia coli* (D) *Kingella kingae*
- 56 由黴菌所引起的 Eumycotic mycetoma，會引發 Black grain mycetoma 的為下列何者？  
 (A) *Pseudallescheria boydii* (B) *Exophiala jeanselmei*  
 (C) *Histoplasma capsulatum* (D) *Sporothrix schenckii*
- 57 下列何種黴菌的菌落成土黃金色 (khaki color)，鏡檢時 Macroconidia 呈粗大棍棒狀 (club shaped) 的平滑壁 (smooth-walled) 端？  
 (A) *Epidermophyton floccosum* (B) *Microsporum audouinii*  
 (C) *Microsporum canis* (D) *Microsporum gypseum*
- 58 下列何者不是 dimorphic fungus ?  
 (A) *Blastomyces dermatitidis* (B) *Histoplasma capsulatum*  
 (C) *Penicillium citrinum* (D) *Penicillium marneffeii*
- 59 分離黴菌所使用的培養基中加入 chloramphenicol，主要是作為下列何種用途？  
 (A) 抑制污染的絲狀形黴菌生長 (B) 抑制酵母菌生長  
 (C) 抑制細菌生長 (D) 抑制病毒生長
- 60 下列何種黴菌為白毛症 (White Piedra) 的致病原？  
 (A) *Fonsecaea compacta* (B) *Trichosporon beigelii*  
 (C) *Piedraia hortae* (D) *Phaeoannellomyces werneckii*

- 61 下列那種孢子是屬於黴菌的有性生殖型 (Sexual form) ?  
(A) chlamydospore (B) blastospore (C) arthrospore (D) ascospore
- 62 *Cryptococcus neoformans* 在 Niger seed agar 上出現顏色是表示有下列何種酵素的產生：  
(A) Oxidase (B) Phenoloxidase (C) DNase (D) Urease
- 63 下列何種細菌不是因人類接觸到受污染的土壤或水而感染的？  
(A) *Burkholderia pseudomallei* (B) *Haemophilus influenzae*  
(C) *Leptospira* spp. (D) *Mycobacterium marinum*
- 64 下列細菌與其天生具抗性的抗生素的配對中，何者錯誤？  
(A) Aerobic bacteria - metronidazole (B) Anaerobic bacteria - aminoglycosides  
(C) *Leuconostoc* - vancomycin (D) Gram-positive bacteria - vancomycin
- 65 下列何種細菌是引起人類 Melioidosis 的病原菌？  
(A) *Burkholderia gladioli* (B) *Burkholderia cepacia*  
(C) *Burkholderia pseudomallei* (D) *Bordetella holmesii*
- 66 在 blood culture 培養液中加入的抗凝劑 (SPS)，會抑制下列何種細菌生長？  
(A) *Staphylococcus aureus* (B) *Peptostreptococcus anaerobius*  
(C) *Streptococcus pneumoniae* (D) *Escherichia coli*
- 67 下列何者不是引起食物中毒的細菌？  
(A) *Listeria monocytogenes* (B) *Staphylococcus aureus*  
(C) *Vibrio parahaemolyticus* (D) *Streptococcus pyogenes*
- 68 下列何種菌不會產生 H<sub>2</sub>S？  
(A) *Erysipelothrix rhusiopathiae* (B) *Aeromonas* spp.  
(C) *Salmonella* spp. (D) *Edwardsiella* spp.
- 69 下列疾病與其病原菌的配對中，何者錯誤？  
(A) Sporotrichosis-*Erysipelothrix rhusiopathiae* (B) Lyme disease-*Borrelia* spp.  
(C) Syphilis-*Treponema pallidum* (D) Tuberculosis-*Mycobacterium tuberculosis*
- 70 下列 *Candida* spp. 中，何者可形成 Chlamydospore？  
(A) *C. dubliniensis* (B) *C. guilliermondii* (C) *C. parapsilosis* (D) *C. krusei*
- 71 金黃色葡萄球菌產生對抗 methicillin 主要是由下列何種抗藥性基因所導致？  
(A) *vanA* (B) *mecA* (C) *ermA* (D) *norA*
- 72 腎絲球腎炎由下列何種細菌感染導致？  
(A) *Streptococcus pyogenes* (B) *Staphylococcus aureus*  
(C) *Haemophilus influenzae* (D) *Neisseria gonorrhoeae*
- 73 下列有關 *Borrelia burgdorferi* 的敘述，何者正確？  
(A) 屬於密螺旋菌 (B) 屬於鈎端螺旋菌  
(C) 引起萊姆病 (Lyme disease) (D) 引起回歸熱 (relapsing fever)
- 74 引起 Yaws 之病原菌為：  
(A) *Treponema pallidum* subsp. *pallidum* (B) *Treponema pallidum* subsp. *endemicum*  
(C) *Treponema carateum* (D) *Treponema pallidum* subsp. *pertenue*
- 75 下列何者不是 MacConkey 瓊脂的特性？  
(A) 是一種選擇性培養基 (B) 具有區別作用  
(C) 可抑制革蘭氏陽性菌生長 (D) 含有高濃度的 NaCl 可提供耐鹽菌株生長
- 76 於 Simmon's citrate agar 中所使用的指示劑是：  
(A) Cresol red (B) Phenol red (C) Bromothymol blue (D) Bromocresol purple
- 77 有三種 *Campylobacter* 較常造成小孩子腹瀉，下列何項試驗可將最常見的 *C. jejuni* subsp. *jejuni* 與 *C. coli* 及 *C. lari* 區別？  
(A) 42°C 生長能力 (B) 對 cephalothin 的抵抗性  
(C) 還原 nitrate 的能力 (D) 水解 hippurate 的能力
- 78 下列有關 *Eikenella corrodens* 特性之敘述，何者錯誤？  
(A) 可在 BAP 及 chocolate agar 生長，菌落有漂白水味，並有 agar-pitting 現象  
(B) 在 MacConkey agar 不能生長  
(C) 專性厭氧，革蘭氏陰性細長桿菌  
(D) Urease 陰性，oxidase 陽性，多數為 catalase 陰性
- 79 A 群鏈球菌的毒力因子中，何者具有超級抗原 (superantigen) 之特性，而且是潛溶噬菌體 (lysogenic bacteriophage) 的基因產物？  
(A) Streptococcal pyrogenic exotoxin A and C (SPE A and SPE C)  
(B) DNase B  
(C) Streptolysin O  
(D) M protein
- 80 下列何種離子的存在對細菌外膜結構的完整性扮演很重要角色，也因此必須加在藥敏試驗培養基中？  
(A) Cl<sup>-</sup> (B) PO<sub>4</sub><sup>3-</sup> (C) Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup> (D) Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>